類證活人書

附釋音辨誤藥性

二

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

書人活證類

附釋音辨誤藥性

(二)

朱肱撰

類證活人書卷第十二

此一卷說藥證并藥方加減法。所謂藥證者。藥方前有證也。如某方治某病是也。傷寒有證異而病同一經。藥同而或治兩證。類而分之。參而伍之。審知某證者。某經之病。某湯者。某證之藥。然後用之。萬全矣。又況百問中一證下有數種藥方主之者。須是將病對藥。將藥合病。乃可服之。假如下利而心下痞。稱十棗湯、大柴胡、生薑瀉心湯、甘草瀉心湯、赤石脂禹餘糧湯、桂枝人參湯之類。雖均是治下利而心下痞。其方有冷有熱。子細詳藥證以對治之。則無不中矣。所謂藥方并加減法者。仲景傷寒方一百十三道。病與方相應。乃用正方。科有差別。即隨證加減。昔人云。學方三年無病可醫。療病三年無方可治。往往世傳爲名論。竟不知執方療病。或中或否。不知加減。移咎於方。古人用藥。如斗運轉。故攻病的而取效速。一服知。二服愈。假如理中圓證。腎氣動者去白朮。小柴胡湯證。小便不利者加茯苓。蓋脾惡濕。腎惡燥。白朮治濕。茯苓利水。故腎氣動者去白朮。小便不利者加茯苓。以此推之。然後知不可執方療病。須是隨證加減。今於逐方下說病證用藥加減。庶幾修合之際。便見治法。兼古方凡稱㕮咀者。直云剉如麻豆大。云一升者。只用一大白盞。以古准今。易曉而通用也。尋常疾勢輕者。只抄麄末五錢匕。水一盞半。入薑棗。煮七八分。去滓服之。未知再作。病勢重者。當依古劑法。古之三兩。即今之一兩也。二兩即今之六錢半也。古之三勝。即今之一勝也。料例大者。只合三分之一是也。

桂枝湯。（一）太陽中風。陽浮陰弱。發熱汗出。惡寒鼻鳴乾嘔者。宜服之。○太陽病頭痛發熱汗出惡風者。宜服之。○太陽病下之後。其氣上衝者宜服之。○桂枝本爲解肌。若脉浮緊發熱汗不出者。不可與之。○太陽病服桂枝湯。煩不解。先刺風池風府。却與桂枝湯。○服桂枝湯大汗出。脉洪大者。與桂枝湯。若形似瘧一日再發者。宜桂枝二麻黃一湯。○服桂枝湯大汗出。大煩渴不解。脉洪大者。白虎加人參湯主之。○服桂枝湯。或下之。仍頭項強痛。翕翕發熱無汗。心下滿微痛。小便不利者。桂枝去桂加茯苓白朮湯主之。○傷寒脉浮自汗出。小便數。心煩微惡寒。脚攣急。與桂枝湯得之便厥。咽乾煩躁吐逆。作甘草乾薑湯與之。厥愈。更作芍藥甘草湯與之。其脚伸。若胃氣不和。與調胃承氣湯。若重發汗如燒鍼者。四逆湯主之。○太陽病外證未解。脉浮弱者。當以汗解宜服。○太陽病外證未解。不可下也。下之爲逆。解外宜服。○太陽病先發汗不解。復下之。脉浮者不愈。浮爲在外而反下之。故令不愈。今脉浮。故知在外。當須解外則愈。宜服。○病常自汗出者。此爲榮氣和。榮氣和者。外不諧也。以衞氣不共榮氣諧和故爾。以榮行脉中。衞行脉外。復發其汗。榮衞和則愈。宜服。○病人藏無他病。時發熱自汗出而不愈者。衞氣不和也。先其時發汗則愈。宜服。○傷寒不大便六七日。頭痛有熱。與承氣湯。小便清者。知不在裏。當發汗。宜服。○傷寒發汗解半日許。復熱煩。浮數者。可更發汗。宜服。○傷寒醫下之。清穀不止。身疼痛。急當救裏。後身疼痛。清便自調。急當救表。救裏宜四逆湯。救表宜桂枝湯。○太陽病發熱汗出。榮弱衞強。故使汗出。欲救邪風。宜服。○傷寒大下後。復發汗。心下痞。惡寒者。不可攻痞。先解表。表解乃可攻痞。解表宜桂枝湯。攻痞宜大黃黃連瀉

心湯。○太陽病不解。熱結膀胱。其人如狂。血自下。下者愈。其外不解者。尙未可攻。當先解其外。外解已。但小腹急結者。乃可攻之。宜桃核承氣湯。其解外宜服。已上屬太陽。○陽明病脈遲汗出多。微惡寒。表未解宜服。○病人煩熱汗出解。如瘧狀。日晡發熱。脈實者。宜大承氣湯。脈浮虛者宜服。已上屬陽明。○太陰病脈浮。可發汗宜服。屬太陰。○下利腹脹滿。身疼痛者。先溫裏。乃攻表。溫裏宜四逆湯。攻表宜服。屬厥陰。○吐利止。身痛不休。宜桂枝湯小和之。屬霍亂。

桂枝　芍藥各三錢。　甘草二兩炙。

右剉如麻豆大。每服抄五錢匕。水壹盞半。入生薑五片。棗子貳枚。煎至壹盞。去滓溫服。須臾歠熱稀粥壹盞。以助藥力。溫覆令一時許。遍身漐漐微似有汗者佳。○加減法。桂枝湯自西北二方居人。四時行之無不應驗。江淮間唯冬及春可行之。自春末及夏至已前。桂枝證可加黃芩一分。謂之陽旦湯。夏至後有桂枝證可加知母半兩。石膏一兩。或加升麻一分。若病人素虛寒者。正用古方。不在加減也。○戒曰。桂枝最難用。雖云表不解。脈浮可發汗。宜桂枝湯。須是病人常自汗出。小便不數。手足溫和。或手足指稍作微冷。少頃却溫。身雖微似煩而又增寒。始可行之。若病人身無汗。小便數。或手足冷。不惡寒。或飲酒家不喜甘者。愼不可行桂枝也。仍有桂枝證服湯已。無桂枝證者。尤不可再與。

桂枝麻黃各半湯。（二）太陽病得之八九日。如瘧狀。發熱惡寒。熱多寒少。其人不嘔。清便欲自可。一日三二度發。脈微緩者。爲欲愈也。脈微而惡寒者。此陰陽俱虛。不可更發汗、更下、更吐也。面色反有熱色者。未

欲解也。以其不能得小汗出。身必痒宜服。屬太陽。

桂枝　芍藥　甘草炙各八錢。　麻黃半兩。湯泡焙秤。　杏仁壹拾貳箇。湯浸去皮尖兩仁者。

右剉如麻豆大。每服抄五錢匕。生薑四片。棗子一枚。水一盞半。煮至八分。去滓温服。又見辯誤。

桂枝二麻黃一湯。（三）服桂枝湯大汗出。脈洪大者。與桂枝湯如前法。若形似瘧。一日再發者。汗出必解宜服。屬太陽。

桂枝八錢半。　芍藥五錢半。　杏仁八箇。沸湯浸去皮尖。　甘草二分半炙。　麻黃三錢一字。湯泡去黃汁焙乾秤。

右剉如麻豆大。每服抄五錢匕。生薑四片。棗子一枚。水一盞半。煮至八分。温服。以微汗爲度。又見辯誤。

桂枝二越婢一湯。（四）太陽病發熱惡寒。熱多寒少。脈微弱者。此無陽也。不可發汗。宜服之。屬太陽。

桂枝　芍藥　甘草各半兩。　石膏陸錢。搥碎。　麻黃半兩。湯泡去黃汁焙乾秤。

右剉如麻豆大。每服抄五錢匕。生薑四片。棗子一枚。水一盞半。煮至八分。去滓温服。又見辯誤。

桂枝加桂湯。（五）燒鍼令其汗。鍼處被寒。核起而赤者。必發奔豚氣。從小腹上衝心者。灸其核上各一壯。與此藥。屬太陽。

桂枝五兩。　芍藥三兩。　甘草炙二兩。

右剉如麻豆大。每服抄五錢匕。生薑四片。棗子一枚。水一盞半。煮至八分。去滓温服。桂枝湯加桂。以桂能泄奔豚之氣也。

桂枝加附子湯。（六）太陽病發汗。遂漏不止。其人惡風。小便難。四支微急。難以屈伸者。宜服之。屬太陽。

桂枝去皮。　芍藥各一兩半。　甘草一兩炙。　附子炮去皮。用半箇。

右剉如麻豆大。每服抄五錢匕。生薑四片。棗子一枚。水一盞半。煮至八分。去滓温服。

桂枝去芍藥湯。（七）太陽病下之後。脈促胸滿者。宜服之。屬太陽。

桂枝一兩半去皮。　甘草一兩炙。

右剉如麻豆大。每服抄五錢匕。生薑四片。棗子一枚。水一盞半。煮至八分。去滓温服。芍藥味酸。脉促胸滿。恐成結胸。故去芍藥。佐則單用辛甘發散毒氣也。

桂枝去芍藥加附子湯。（八）太陽病下之後。脈促胸滿者。桂枝去芍藥湯主之。若微寒者宜服之。屬太陽。

桂枝一兩半去皮。　甘草一兩炙。　附子去皮尖半箇炮。

右剉如麻豆大。每服抄五錢匕。生薑四片。棗子一枚。水一盞半。煮至八分。去滓温服。小便利卽愈。

桂枝去桂加茯苓白朮湯。（九）服桂枝湯或下之。仍頭項強痛。翕翕發熱無汗。心下滿微疼。小便不利者。此主之。屬太陽。

芍藥　茯苓　白朮各一兩半。　甘草一兩炙。

右剉如麻豆大。每服抄五錢匕。生薑四片。棗子一枚。水一盞半。煮至八分。去滓温服。小便利卽愈。

桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯。（十）傷寒脈浮。醫火却之。亡陽必驚狂。臥起不安者。此主之。

桂枝　蜀漆各一兩半。　甘草一兩炙。　牡蠣二兩半。　龍骨二兩。

右剉如麻豆大。每服抄五錢匕。生薑四片。棗子一枚。水一盞半。煮至八分。去滓温服。

桂枝加芍藥生薑人參新加湯。（十一）發汗後身疼痛。脈沈遲者。此主之。屬太陽。

桂枝　人參各一兩半。　芍藥二兩。　甘草一兩炙。

右剉如麻豆大。每服抄五錢匕。生薑四片。棗子一枚。水一盞半。煮至八分。去滓温服。

桂枝加芍藥湯。（十二）太陽病下之。因腹滿痛。屬太陰。此主之。

桂枝三兩。　甘草二兩炙。　芍藥六兩。下利者先煎芍藥三四沸。

右剉如麻豆大。每服抄五錢匕。生薑四片。棗子一枚。水一盞半。煮至八分。去滓温服。

桂枝加大黃湯。（十三）太陽病反下之。因腹滿痛。屬太陰。桂枝加芍藥湯主之。大實痛者。此主之。

桂枝六分去皮。　芍藥三兩。　甘草一兩炙。　大黃二兩。　痛甚者加大黃。大實痛者。加一兩半。羸者減之。

右剉如麻豆大。每服抄五錢匕。生薑四片。棗子一枚。水一盞半。煮至八分。去滓温服。又見辯誤。

桂枝甘草龍骨牡蠣湯。（十四）火逆下之。因燒鍼煩躁者。此主之。屬太陽。

桂枝半兩去皮。　甘草炙。　牡蠣熬。　龍骨各一兩。

右剉如麻豆大。每服抄五錢匕。水一盞半。煮至八分。去滓温服。

桂枝甘草湯。（十五）發汗過多。其人叉手自冒心。心下悸。欲得按者。此主之。屬太陽。

桂枝二兩去皮。　甘草一兩炙。

右剉如麻豆大。每服抄五錢匕。水一盞半。煮至八分。去滓溫服。

桂枝人參湯（十六）太陽病外證未除。而數下之。遂協熱而利。利下不止。心下痞鞕。表裏不解者。此主之。

桂枝一兩三錢。　甘草一兩三錢炙。　乾薑炮。　人參各一兩。　白朮

右剉如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。煮至八分。去滓溫服。日再、夜一服。

桂附湯（十七）傷寒八九日。風濕相薄。身體疼煩。不能自轉側。不嘔不渴。脈浮虛而濇者。此主之。若其人大便鞕。小便自利者。去桂加白朮湯主之。屬太陽。

桂枝一兩三錢。若大便鞕小便自利者。去桂加白朮一兩三錢。　附子一箇炮去皮。　甘草三分炙。

右剉如麻豆大。每服抄五錢匕。生薑四片。棗子一枚。水一盞半。煮至八分。去滓溫服。日三服。

桂枝加葛根湯（十八）太陽病項強。几几反汗出。惡風者。此主之。伊尹湯液論。桂枝湯中加葛根。今監本用麻黃誤矣。

桂枝　甘草炙。　芍藥各六錢三字。　葛根一兩三錢。　麻黃一兩一錢本無。

右剉如麻豆大。每服抄五錢匕。生薑四片。棗子一枚。水一盞半。煮至八分。去滓服。覆取微汗。

桂枝加厚朴杏子湯（十九）太陽病下之。微喘者。表未解故也。此主之。屬太陽。

桂枝去皮。　芍藥各一兩。　甘草六錢三字炙。　杏仁去皮尖十七箇。　厚朴去皮薑汁炙六錢三字。

右剉如麻豆大。每服抄五錢匕。生薑四片。棗子一枚。煮至八分。去滓溫服。覆取微汗。

麻黃湯（二十）太陽病頭痛發熱。身疼惡風。無汗而喘者。宜服。○太陽陽明合病。喘而胸滿。不可下。宜服。

○太陽病十日以去脈浮細而嗜臥者外已解也設胸滿者與小柴胡湯脈但浮無餘證者與服之○太陽病脈浮緊無汗發熱身疼痛八九日不解表證仍在此當發其汗服藥已微除其人發煩目瞑劇者必衄衄乃解所以然者陽氣重故也此主之○傷寒脈浮緊不發汗因衄此主之已上屬太陽○陽明病脈浮無汗而喘發汗則愈宜服○脈但浮無餘證者與服若不溺腹滿加噦者不治已上屬陽明

甘草半兩炙　桂枝一兩　杏仁三十五箇去皮尖　麻黃一兩半去節百沸湯泡去黃汁焙乾秤

右剉如麻豆大每服抄五錢匕水一盞半煮至八分去滓溫服覆取微汗不須歠粥加減法傷寒熱病藥性須涼不可太溫夏至後麻黃湯須加知母半兩石膏一兩黃芩一分蓋麻黃湯性熱夏月服之有發黃斑出之失唯冬及春與病人素虛寒者乃用正方不在加減

麻黃杏子甘草石膏湯（二十一）發汗後不可更行桂枝湯汗出而喘無大熱者可與此服之屬太陽

甘草一兩炙　石膏四兩碎綿裹　杏仁二十五箇去皮尖　麻黃二兩去節湯泡去黃汁焙乾秤

右剉如麻豆大每服抄五錢匕水一盞半煮至八分去滓溫服

麻黃附子甘草湯（二十二）少陰病得之二三日可與此藥微發汗以二三日無證故微發汗也屬少陰

麻黃貳兩去節湯泡去黃汁焙乾秤　甘草貳兩炙　附子一枚炮去皮破八片

右剉如麻豆大每服抄五錢匕水一盞半煮至八分去滓溫服相次二兩服以身微汗為度

麻黃細辛附子湯（二十三）少陰病始得之反發熱脈沉者此主之屬少陰

麻黃二兩・去節・湯炮去黃汁・焙乾秤・　細辛二兩・　附子一枚・炮去皮破八片・

右剉如麻豆大。每服抄五錢匕。水一盞半。煮至八分。去滓温服。

麻黃連翹赤小豆湯（二十四）傷寒瘀熱在裏。身必黃。此主之。屬陽明・

麻黃一兩・去節・湯泡去黃汁・焙乾秤・　甘草一兩炙・　赤小豆半升・　杏仁貳拾枚去皮尖・　生梓白皮切二兩・　連翹一兩・或作半兩連翹根是・

右剉如麻豆大。每服抄五錢匕。生薑四片。棗子一枚。水一盞半。煮至八分。去滓温服。

麻黃升麻湯（二十五）傷寒六七日。大下後。寸脈沉而遲。手足厥逆。下部脈不至。咽喉不利。唾膿血。泄利不止者。爲難治。此主之。屬厥陰・

麻黃二兩半・去節・湯泡去黃汁・焙乾秤・　升麻　當歸各一兩一分・　知母　黃芩　萎蕤各三分・　芍藥　麥門冬去心・　桂枝去皮・　茯苓　甘草炙・　乾薑炮・　石膏碎絹裹・　白朮各一分・

右剉如麻豆大。每服抄五錢匕。水一盞半。煮至八分。去滓温服。相次一炊久。進一服。汗出愈。

葛根湯（二十六）太陽病項背強几几無汗惡風。又太陽與陽明合病者。必自利。此並主之。屬太陽・

葛根二兩・　桂枝去皮・　甘草炙・　芍藥各一兩・　麻黃一兩半・去節・湯泡去黃汁・焙乾秤・

右剉如麻豆大。每服抄五錢匕。生薑四片。棗子一枚。水一盞半。煮至八分。去滓温服。覆取汗爲度。

葛根加半夏湯（二十七）太陽與陽明合病。不下利。但嘔者。此主之。屬太陽・

葛根四兩或作一兩．半夏六錢一字．麻黃三分．去節．湯泡去黃汁．焙乾秤．甘草炙．桂枝去皮．芍藥各半兩．

右剉如麻豆大．每服抄五錢匕．生薑四片．棗子一枚．水一盞半．煮至八分．去滓温服．覆取微汗．

葛根黃芩黃連湯（二十八）太陽病桂枝證醫反下之利遂不止．脈促者．表未解也．喘而汗出者．此主之．

葛根四兩．黃芩一兩半．黃連六兩或人作二兩半．甘草二兩炙．

右剉如麻豆大．每服五錢．水一盞半．煮至八分．去滓温服．日進二三服．

小柴胡湯（二十九）太陽病十日以去．脈浮細而嗜臥者．外已解．設胸滿痛．與服．脈但浮者．與麻黃湯．○傷寒五六日中風往來寒熱．胸脅苦痛．默默不欲食．心煩喜嘔．或胸煩而不嘔．或渴或腹中痛．或脅下痞鞕．或心下悸．小便不利．或不渴．身有微熱．或欬者．此主之．○血弱氣盡．腠理開．邪氣因入．與正氣相薄．結於脅下．邪正分爭．往來寒熱．休作有時．默默不欲飲食．藏府相連．其痛必下．邪高痛下．故使嘔也．此主之．○服柴胡湯已．渴者屬陽明．以法治之．○傷寒四五日．身熱惡風．頸項強．脅下滿．手足温而渴者．此主之．○傷寒陽脈濇．陰脈弦．法當腹中急痛．先與小建中湯．不差者．此主之．○太陽病．過經十餘日．發汗吐下之後．四五日柴胡湯證仍在者．先與小柴胡．嘔不止．心下急．鬱鬱微煩者．爲未解也．與大柴胡湯．下之即愈．○婦人中風七八日．續得寒熱．發作有時．經水適斷者．此爲熱入血室．其血必結．故使如瘧狀．此主之．○傷寒五六日．頭汗出．微惡寒．手足冷．心下滿．不欲食．大便鞕．脈細者．爲陽微結．必有表．復有裏也．脈沉亦在裏也．汗出爲陽微．假令純陰結．不得復有外證．悉入在裏．此爲半在裏．半在表也．脈雖沉緊．不得爲

少陰病所以然者陰不得有汗令頭汗出故知非少陰也可與服此設不了了者得屎而解○傷寒五六日嘔而發熱者柴胡湯證具而以他藥下之柴胡證仍在者復與柴胡湯此雖已下之不爲逆必蒸蒸而振却發熱汗出而解若心下滿而腹痛者此爲結胸也大陷胸湯主之但滿而不痛者此爲痞柴胡不中與之宜半夏瀉心湯已上屬太陽○陽明病發潮熱大便溏小便自可胸脅滿不去者與服之○陽明病脅下鞕滿不大便而嘔舌上白胎者可與服之上焦得通津液得下胃氣因和身濈然汗出而解○陽明中風脈弦浮大而短氣腹都滿脅下及心痛久按之氣不通鼻乾不得汗嗜臥一身及目悉黃小便難有潮熱時時噦身前後腫刺之小差外不解病過十日脈續浮者與此藥主之已上屬少陽○太陽病不解轉入少陽脅下鞕滿乾嘔不能食往來寒熱尙未吐下脈沉緊者此主之若已吐下發汗溫鍼讝語小柴胡湯證罷此爲壞證知犯何逆以法治之已上屬少陽○嘔而發熱者宜服○傷寒差已後更發熱此主之脈浮者以汗解之脈沉實者以下解屬辨陰陽易差後勞復病脉證

黃芩一兩半若腹中痛者去黃芩加芍藥一兩半芍藥或作三分若心下悸小便不利者去黃芩加茯苓二兩

人參一兩半若不渴外有微熱者去人參加桂枝一兩半溫覆微汗愈若欬嗽者去人參并棗子加五味子一兩一分乾薑一兩

棗子六枚若脅下痞鞕去棗子加牡礪二兩熬牡礪或作一兩

半夏一兩一分湯洗若胸中煩不嘔者去半夏人參加括樓實一枚用四分之一若渴者去半夏更加人參三分括樓根二兩

柴胡四兩去蘆

甘草一兩半炙

右剉如麻豆大。每服抄五錢匕。生薑四片。棗子三枚。水一盞半。煑至八分。去滓温服。日三服。

類證活人書卷第十三

大柴胡湯（三十）太陽病過十餘日發汗吐下之後四五日柴胡證仍在者先與小柴胡嘔不止一云嘔止小安心下急鬱鬱微煩者爲未解也與大柴胡湯下之則愈○傷寒十餘日熱結在裏往來寒熱者與服○傷寒發熱汗出不解心中痞鞕嘔吐而下利者此主之已上屬太陽○陽明病汗多者急下之宜服○少陰病下利清水心下痛口乾者可下之宜大柴胡、大承氣湯○病腹中滿痛此爲實當下之宜大承氣、大柴胡湯○腹滿不減減不足言當下之宜大柴胡、大承氣湯○傷寒後脈沉者內實也下之解宜服○傷寒六七日目中不了了睛不和無表裏證大便難身微熱者實也急下之宜大承氣、大柴胡湯○太陽病未解脈陰陽俱停必先振慄汗出而解但陰脈微者下之而解宜服○病人無表裏證發熱七八日雖脈浮數者可下之大柴胡湯主之○病人煩熱汗出則解又如瘧狀日晡所發熱者屬陽明脈實者可下之大柴胡大承氣湯主之屬可下病脉證

柴胡四兩　黃芩各一兩半　芍藥各一兩半　半夏一兩一分洗　枳實貳枚去穰炒千金云枳實去穰一分準貳枚

右剉如麻豆大每服抄五錢匕生薑四片棗子一枚水一盞半煮至八分去滓溫服以利爲度未利再服本方無大黃欲下者加大黃一兩

柴胡桂枝湯（三十一）傷寒六七日發熱微惡寒支節煩頭疼微嘔心下支結外證未去者此主之屬太陽

○發汗多亡陽譫語者。不可下。與此藥和其榮衛。以通津液。後自愈。屬發汗後病脉證。

柴胡三錢一兩　桂枝去皮　黃芩　人參　芍藥各半兩

半夏四錢一字洗　甘草三錢一字炙

右剉如麻豆大。每服抄五錢匕。生薑四片。棗子一枚。水一盞半。煑至八分。去滓温服。

柴胡桂枝乾薑湯。（三十二）傷寒五六日已發汗而復下之。胷脅滿微結。小便不利。渴而不嘔。但頭汗出。往來寒熱。心煩者。此爲未解也。宜服之。屬太陽

柴胡四兩　桂枝去皮　黃芩各一兩半　牡礪熬　甘草炙

乾薑各一兩　栝樓根二兩

右剉如麻豆大。每服抄五錢匕。水一盞半。煑至八分。去滓温服。食頃再服。

柴胡加龍骨牡礪湯。（三十三）傷寒八九日下之。胷滿煩驚。小便不利。譫語。一身盡重不可轉側者。此主之。屬太陽

柴胡　黃芩　龍骨各一兩　鉛丹

人參　桂枝

（上闕）（下闕）（醫統本無三十四三十五方湯）

（上闕）汗多恐亡陽故也。若汗多不止。用温粉撲之。

温粉方

白朮　　藁本　　川芎　　白芷各等分

右擣羅爲細末。每末壹兩。入米粉叁兩和之。粉撲周身止汗。無藁本亦得。若汗已出後盡劑服。汗多亡陽。遂逆惡風煩躁。不得眠也。

小青龍湯（三十六）傷寒心下有水氣。欬而微喘。發熱不渴。服湯已渴者。此寒去欲解也。此主之。○傷寒表不解。心下有水氣。乾嘔發熱而欬。或渴或利。或噎或小便不利。小腹滿。或喘者。此主之。

芍藥　　桂枝去皮　　乾薑炮　　甘草炙

細辛各一兩半　　五味子一兩。別本或加一分　　半夏一兩半。湯洗。若渴者。去半夏。加栝樓根一兩半

麻黃一兩半。微利者去麻黃。加荑花如一彈子。熬令赤色。若噎者。去麻黃加附子半箇炮。若小便不利。小腹滿者。去麻黃加茯苓貳兩。若喘者。去麻黃加杏仁一兩半。去皮尖麻黃湯泡

右剉如麻豆大。每服抄五錢匕。水一盞半。煑至八分。去滓溫服。　杏仁、半夏二味。或各作壹兩壹分。

小建中湯（三十七）傷寒陽脈濇。陰脈弦。法當腹中急痛。先與小建中湯。不差者。小柴胡湯主之。○傷寒二三日。心中悸而煩者宜服。

芍藥三兩　　甘草一兩炙　　桂枝一兩半去皮　　膠飴半升。舊有微溏或嘔者去膠飴局方加黃耆一兩半爲黃耆建中湯

右剉如麻豆大。每服抄五錢匕。水一盞半。生薑四片。大棗子一枚。煑至八分。去滓。下膠飴兩匙。許再煎化。溫服。日三服。夜二服。尺脈尙遲。再作一劑。加黃耆末一錢。

煎造膠飴法

糯米一升揀淘淨。　大麥蘖末六兩。

右米一如炊飯甑上至氣溜取下傾入一盆子入蘖末一合幷湯一盞來許拌和再上甑至飯熟却入盆子內都以蘖末拌和入一甕罐子可容五升許冬月罐子熱春秋夏溫冬月用湯二升許入罐子內約內面飯上湯三指許卽得布幷紙三五重蓋定更以綿或絮抱定近火春秋夏卽溫和至一宿見米浮在水面上卽以布絞裂取清汁銀石器內煎至面上有膜卽以木篦不住手攪至稀糊以甕器收夏月置井中庶不酸。

大陷胷湯（三十八）　太陽病脈浮而動數浮則爲風數則爲熱動則爲痛數則爲虛頭痛發熱微盜汗出而反惡寒表未解也醫反下之動數變遲膈內拒痛胃中空虛客氣動膈短氣躁煩心中懊憹陽氣內陷心下因鞕則爲結胸大陷胷湯主之若不結胸但頭汗出餘處無汗劑頸而還小便不利身必發黃○傷寒六七日結胸熱實脈沈而緊心下痛按之石鞕者宜服○傷寒十餘日熱結在裏復往來寒熱者與大柴胡湯但結胸無大熱者此爲小結在胸脅也但頭微汗出者此主之○太陽病重發汗而下之不大便五六日舌上燥而渴日晡所小有潮熱從心下至小腹鞕滿而痛不可近者此主之○傷寒五六日嘔而發熱者柴胡湯證具而以他藥下之柴胡證仍在者復與柴胡湯此雖已下之不爲逆必蒸蒸而振却發熱汗出而解若心下滿而鞕痛者此爲結胸也此主之已上屬太陽。

大黃一兩半去皮錦文者爲末。　甘遂一字赤連珠者細羅爲末。　芒硝五分。

右以水二盞。先煑大黃至一盞。去滓。下硝一沸。下甘遂末。溫服。得快利。止後服。

又大陷胸湯方

桂枝一兩。　甘遂一兩或作半兩。　大棗一兩或作三枚。　人參一兩。　栝樓實一枚去皮只用四分之一。

右剉如麻豆大。每服五錢匕。水一盞。或作二盞。煑至八分。去滓。溫服。胸中無堅物。勿服之。

大陷胸圓（見辯誤。三十九）又　病發於陽而反下之。熱入因作結胸。病發於陰而反下之。一作汗出。因作痞也。所以成結胸者。以下之太早故也。結胸者。項亦強。如柔痓狀。下之則和。宜此藥主之。屬太陽。

大黃貳兩或作四兩。　芒硝三分。　杏仁三分去皮尖熬黑。　苦葶藶子三錢熬。

右搗羅二味。內杏仁芒硝合研如脂。丸如彈子大。每服一丸。抄甘遂末半錢匕。白蜜一合。水二盞。煑取一盞。頓服。一宿乃下。如不下。再服。甘遂性猛宜斟量虛實服之。

小陷胸湯（見辯誤。四十）又　小結胸病正在心。按之則痛。脈浮滑者。此主之。屬太陽。

半夏湯洗秤一兩半。　黃連一兩。　栝樓一枚去皮或作半枚。

右剉如麻豆大。水二盞。先煑栝樓至一盞半。下諸藥。煎至八分。去滓。溫服。未知再服。微利黃涎便安。

大承氣湯（四十一）陽明病脈遲。雖汗出不惡寒者。其身必重。短氣腹滿而喘。有潮熱者。此外欲解。可攻裏也。手足濈然汗出者。此大便已鞕也。此藥主之。若汗多微發熱惡寒者。外未解也。一法與桂枝湯。其熱不潮。未可與承氣湯。若腹大滿不通者。可與小承氣湯。微和胃氣。勿令大泄下。○陽明病潮熱。大便微鞕者。可與

此藥不鞕者不可與之○傷寒若吐若下後不解不大便五六日上至十餘日日晡所發潮熱不惡寒獨語如見鬼狀若劇者發則不識人循衣摸牀惕而不安微喘直視脈弦者生濇者死微者但發熱譫語者此主之若一服利則止後服○陽明病譫語有潮熱反不能食者胃中必有燥屎五六枚也若能食者但鞕耳宜服○陽明病下血譫語者此爲熱入血室但頭汗出者刺期門隨其實而瀉之濈然汗出則愈汗出譫語者以爲有燥屎在胃中此爲風也須下者過經乃可下之下之若早語言必亂以表虛裏實故也下之愈宜服○二陽併病太陽證罷但發潮熱手足漐漐汗出大便難而譫語者下之則愈宜服○陽明病下之心下懊憹而煩胃中有燥屎者可攻腹微滿初頭鞕後必溏不可攻之若有燥屎者宜服○病人煩熱汗出則解又如瘧狀日晡所發熱者屬陽明也脈實者宜下之脈浮虛者宜發汗下之與大承氣發汗宜桂枝湯○大下後六七日不大便煩不解腹滿痛者此有燥屎也所以然者本有宿食故也宜服○傷寒六七日目中不了了睛不和無表裏證大便難身微熱者此爲實也急下之宜服○陽明病發熱汗多者急下之宜服○得病二三日脈弱無太陽柴胡證煩燥心下鞕至四五日雖能食以小承氣湯少少與微和之令小安至六日與承氣一升若不大便更六七日小便少者雖不大便但初頭鞕後必溏未定成鞕攻之必溏須小便利屎定鞕此主之○發汗不解腹滿痛者急下之宜服○腹滿不減減不足言當下之宜服○病人小便不利大便乍難乍易時有微熱喘冒不能臥者有燥屎也宜服○陽明少陽合病必下利其脈下負者爲順也負者失也互相尅賊名爲負也脈滑而數者有宿食也當下之宜服已上屬陽明

○少陰病二三日。口燥咽乾者。急下之。宜服。○少陰病自利清水。色純青。心下必痛。口乾燥者。可下之。宜服。○少陰病六七日。腹脹不大便者。急下之。宜服。已上屬少陰。○下利三部脈皆平。按之心下鞕者。急下之。宜服。○下利脈遲而滑者。內實也。利未欲止。當下之。宜服。○寸口脈浮而大。按之反濇。尺中微而濇。故知有宿食。當下之。宜服。○下利不欲食者。以有宿食故也。當下之。宜服。○下利差。至其年月日時復發者。以病不盡故也。當下之。此主之。○下利脈反滑。當下所去下乃愈。此主之。○脈雙弦而遲者。必心下鞕。脈大而緊者。陽中有陰也。可下之。宜服。○病腹中滿痛者。此爲實也。當下之。宜服。此主之。已上屬可下病脉證。

大黃貳兩。錦文者去皮生用酒洗過。　枳實肆枚或作叁枚去穰炒淨秤用半兩。　厚朴肆兩去皮薑汁炙。　芒硝貳兩或作一合半。朴消有鹽頭者亦得。

右剉如麻豆大。每服抄五錢匕。水二盞。先煮厚朴枳實至一盞餘。下大黃。煮取六分。去滓。入芒硝。煎一二沸。放溫服。以利爲度。未利再與一服。

小承氣湯（四十二）陽明病。潮熱大便微鞕者。可與大承氣湯。不鞕者。不可與之。若不大便六七日。恐有燥屎。欲知之法。少與小承氣湯。湯入腹中。轉失氣者。此有燥屎也。乃可攻之。若不轉失氣者。此但初頭鞕。後必溏。不可攻之。攻之必脹滿。不能食也。欲飲水者。與水則噦。其後發熱者。必大便復鞕而少也。以小承氣湯和之。不轉失氣者。不可攻也。○陽明病脈遲。雖汗出不惡寒。其氣必重。短氣腹滿而喘。有潮熱者。此爲外欲解。可攻裏也。手足濈然汗出者。此大便鞕。大承氣湯主之。若腹大滿不通者。與小承氣湯微和胃氣。勿令大泄下。○陽明病。其人多汗。以津液外出。胃中燥。大便必鞕。鞕則譫語。此藥主之。若一服譫語止

者。更莫後服。○陽明病譫語潮熱。脈滑而疾者。此藥主之。因與承氣湯一升。腹中轉氣者。更服一升。若不轉氣者。勿更與之。明日又不大便。脈反微濇者。裏虛也。爲難治。不可更與承氣湯。○太陽病。若吐。若下。若發汗後。微煩。小便數。大便鞕者。與小承氣湯和之愈。○得病二三日。脈弱無太陽柴胡證。煩躁心下鞕。至四五日雖能食。以小承氣湯少少與。微和之。令小安。下利譫語者。有燥屎也。此主之。

大黃肆兩去皮。　厚朴貳兩去皮薑汁炙。　枳實肆枚或作叁枚。去穰炒淨秤半兩也。

右剉如麻豆大。每服抄五錢匕。以水一大盞半。煎至八分。去滓。溫服。以利爲度。初服湯更衣者。止後服。不爾者。再服之。

調胃承氣湯（四十三）發汗後。惡寒。虛故也。不惡寒。但熱者。實也。當和胃氣。此主之。○太陽病未解。脈陰陽俱停。必先振慄汗出而解。但陽脈微者。先汗之而解。但陰脈微者。下之而解。若欲下之。宜服。○傷寒脈浮自汗出。小便數。心煩微惡寒。脚攣急。與桂枝湯欲攻其表。此誤也。得之便厥。咽中乾。煩燥吐逆。作甘草乾薑湯與之。以復其陽。若厥愈足溫者。更作芍藥甘草湯與之。其脚卽伸。若胃氣不和譫語者。少與調胃承氣湯。○傷寒十三日。過經譫語者。以有熱也。當以湯下之。若小便利者。大便當鞕。而反下利。脈調和者。知醫以圓藥下之。非其治也。若自下利者。脈當微厥。今反和者。此爲內實也。此主之。○太陽病過經十餘日。心下溫溫欲吐。而胸中痛。大便反溏。腹微滿。鬱鬱微煩。先此時自極吐下者。與服之。若不爾者。不可與。但欲嘔。胸中痛微溏者。此非柴胡證。以嘔。故知極吐下也。○陽明病不吐不下。心煩者。可與服。○太陽病

三日發汗不解。蒸蒸熱者。屬胃也。此主之。○傷寒吐後。腹脹滿者。與服。已上屬陽明。

甘草一兩。　大黃貳兩。去皮。　芒硝一兩三分。或作一兩一分。

右剉如麻豆大。每服五錢。以水一大盞。煎至七分。去滓下硝。更上火二三沸。溫頓服之。

桃核承氣湯（四十四）太陽病不解。熱結膀胱。其人如狂。血自下下者愈。其外不解者。尙未可攻。當先解其外。外解已。但少腹結者。乃可攻之。宜用此藥。

大黃肆兩。　桂枝去皮貳兩。　甘草貳兩炙。　芒硝貳兩。　桃仁去皮尖雙仁者五十箇搥碎。

右剉如麻豆大。每服五錢匕。以水二大盞。煎至八分。去滓下硝。煎化。溫服。以微利爲度。未利。移時再服。

梔子豉湯（四十五）發汗吐下後。虛煩不得眠。若劇者。必反覆顚倒。心中懊憹。此主之。○發汗若下之。而煩熱。胸中窒者。此主之。○仲景云。凡用梔子湯。病人舊微溏者。不可與服之。○傷寒五六日。大下之後。身熱不去。心中結痛者。未欲解也。此主之。已上屬太陽。○陽明病。脈浮而緊。咽燥口苦。腹滿而喘。發熱汗出。不惡寒。反惡熱。身重。若發汗則燥。心憤憤反譫語。若加溫鍼。必怵惕煩躁不得眠。若下之。則胃中空虛。客氣動膈。心中懊憹。舌上胎者。此主之。○陽明病下之。外有熱。手足溫。不結胸。心中懊憹。饑不能食。但頭汗出者。此主之。○下利後更煩。按之心下濡者。爲虛煩也。此主之。屬厥陰。

香豉二兩。　肥梔子十六箇擘碎。或作十四箇。

右剉如麻豆大。每服五錢。水二盞。先煮梔子至一盞。入豉。煎至七分。去滓溫服。得快吐。止後服。

梔子甘草豉湯（四十六）發汗吐下後。虛煩不得眠。若劇者。必反覆顛倒。心中懊憹。梔子豉湯主之。若少氣者。此主之。屬太陽。

梔子七枚。　甘草　豉各一兩。

右分二服。以水二盞。先煎梔子甘草至一盞。內豉同煎。取七分。去滓溫服。得快吐。止後服。

梔子生薑豉湯（四十七）發汗吐下後。虛煩不得眠。若劇者。必反覆顛倒。心中懊憹。梔子豉湯主之。若嘔者。當主之。屬太陽。

梔子七枚。　生薑二兩半。　豉一兩。

右分二服。以水二盞。先煮梔子生薑至一盞。內豉同煎。至七分。去滓溫服。得快吐。止後服。

類證活人書卷第十四

梔子厚朴湯（四十八）治傷寒下後心煩腹滿臥起不安者屬太陽

梔子大者柒枚擘碎　厚朴去皮薑汁炙貳兩　枳實貳枚取去穰麩炒秤一分

右剉如麻豆大分作二服以水二盞半煎至八分去滓温服得吐止後服

梔子乾薑湯（四十九）治傷寒醫以丸藥下之身熱不去微煩者屬太陽

梔子柒枚　乾薑一兩

右剉如麻豆大分二服以水二大盞煎至七分去滓温服得吐止後服凡用梔子湯病人舊微溏者不可與之

梔子蘖皮湯（五十）治傷寒身黃發熱屬太陽

梔子捌枚　黃蘖一兩　甘草半兩炙

右剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至七分去滓温服

茯苓桂枝甘草大棗湯（五十一）治發汗後其人臍下悸者欲作奔豚屬太陽

桂枝貳兩去皮　甘草一兩炙　茯苓去皮陸兩或作肆兩

右剉如麻豆大每服五錢棗二箇用甘爛水一盞半煎至八分去滓温服作甘爛水法用水二斗置大盆中以杓揚之上有珠子五六千顆有珠相逐取用

茯苓桂枝白朮甘草湯（五十二）治傷寒若吐若下後心下逆滿氣上衝胸起則頭眩脈沈緊發汗則動經身爲振振搖者屬太陽

茯苓貳兩　桂枝一兩半　甘草炙　白朮一兩

右剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服

茯苓甘草湯（五十三）傷寒汗出而渴者五苓散主之不渴者此主之屬太陽

桂枝去皮　茯苓各貳兩　甘草一兩炙

右剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半生薑五片煎至八分去滓溫服

甘草湯（五十四）少陰病二三日咽痛者可與服不差者與桔梗湯

甘草貳兩

右剉如麻豆大每服四錢匕水一盞煎至六分去滓溫服日二服

甘草乾薑湯（五十五）傷寒脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩躁吐逆者宜此藥屬太陽

甘草四兩炙　乾薑貳兩炮

右剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服

炙甘草湯（五十六）治傷寒脈結代心動悸屬太陽

甘草貳兩炙。　人參一兩。　生地黃八兩。　桂枝一兩半去皮。　麻仁一兩一分。　麥門冬一兩一分去心。

右剉如麻豆大。每服五錢匕。入薑五片。棗一枚。水一盞半。入酒半盞。煎至八分。去滓內阿膠一片。膠烊盡。溫服。日三服。

芍藥甘草湯（五十七）傷寒脈浮自汗出。小便數。心煩微惡寒。脚攣急。反與桂枝欲攻其表。此誤也。得之便厥。咽乾煩躁逆者。作甘草乾薑湯與之。以復其陽。若厥愈。足溫者。更與此藥。屬太陽。

甘草　白芍藥各貳兩。

右剉如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。煮至八分。去滓溫服。

厚朴生薑半夏人參湯（五十八）治發汗後腹脹滿者。屬太陽。

厚朴四兩去皮。　半夏一兩一分。　甘草一兩。　人參半兩。

右剉如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。生薑五片。煮至八分。去滓溫服。

大黃黃連瀉心湯（五十九）治心下痞。按之濡。其脈關上浮者。若傷寒大下後。復發汗。心下痞惡寒者。表未解也。不可攻痞。當先解表。表解乃可攻痞。解表宜桂枝湯。攻痞宜服此藥。屬太陽。

大黃貳兩。　黃連一兩。　黃芩一兩。

右剉如麻豆大。每服五錢匕。以百沸湯二大盞。熱漬之一時久。絞去滓。煖動分二服。

附子瀉心湯（六十）治心下痞而復惡寒汗出者。屬太陽。

大黃貳兩　黃連　黃芩各一兩　附子壹枚炮去皮破別煑取汁

右三味剉如麻豆大每服五錢以百沸湯二大盞熱漬之一時久絞去滓內附子汁分溫再服

半夏瀉心湯（六十一）傷寒五六日嘔而發熱者柴胡湯證具而以他藥下之柴胡證仍在者復與柴胡湯此雖已下之不爲逆必蒸蒸而振却發熱汗出而解若心下滿而鞕痛者此爲結胸也大陷胸湯主之但滿而不痛者此爲痞柴胡不中與之宜服此屬太陽

黃連半兩　黃芩　乾薑炮　人參　甘草炙各一兩半　半夏一兩一分湯洗七遍

右剉如麻豆大每服五錢匕大棗二枚水一盞半煎至八分去滓溫服

甘草瀉心湯（六十二）傷寒中風醫反下之其人下利日數十行穀不化腹中雷鳴心下痞鞕而滿乾嘔心煩不得安醫見心下痞謂病不盡復下之其痞益甚此非結熱但以胃中虛客氣上逆故使鞕也宜服此

甘草貳兩炙　乾薑炮　黃芩各一兩半　人參　黃連各半兩　大棗六枚　半夏一兩一分洗

右剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服

生薑瀉心湯（六十三）治傷寒汗出解之後胃中不和心下痞鞕乾噫食臭脅下有水氣腹中雷鳴下利者屬太陽

黃芩　甘草炙　人參各一兩半　乾薑炮　黃連各半兩　半夏一兩一分泡

右剉如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。生薑七片。棗子二枚。煎至一盞。去滓溫服。

白虎湯（六十四）治傷寒脈浮滑者。表裏有熱。○又三陽合病。腹滿身重難以轉側。口中不仁。面垢譫語遺尿。發汗則譫語。下之則額上生汗。手足逆冷。若自汗出者。○傷寒脈滑而厥者。裏有熱。並主之。

知母三兩。　甘草一兩炙。　石膏搗兩碎綿裹。　粳米叁合。

右剉如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。取米熟爲度。去滓溫服。

白虎加人參湯（六十五）服桂枝湯大汗出。大煩渴不解。脈洪大者。○傷寒若吐若下。後七八日不解。熱結在裏。表裏俱熱。時時惡寒。大渴。舌上乾燥而煩。欲飲水數升者。○傷寒無大熱。口燥渴。心煩。背微惡寒者。並主之。

人參貳分。　知母一兩半。　甘草炙二兩或作半兩。　粳米一合半。　石膏四兩碎綿裹。

右剉如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。取米熟爲度。去滓溫服。

五苓散（六十六）太陽病發汗後。大汗出。胃中乾。煩燥不得眠。欲得飲水者。少少與飲之。令胃氣和則愈。若脈浮小便不利。微熱稍渴者。○發汗已。脈浮數煩渴者。○傷寒汗出而渴者。不渴者與茯苓甘草湯。○中風發熱六七日不解而煩。有表裏證。渴欲飲水。水入則吐。名曰水逆者。○本以下之。故心下痞。與瀉心湯。痞不解。其人渴而口燥煩。小便不利者。○太陽病寸緩關浮尺弱。其人發熱汗出復惡寒。不嘔。但心下痞者。此以醫下之也。如其不下者。病人不惡寒而渴者。此轉屬陽明也。小便數者。大便必鞕。不更衣十日。無所苦也。欲

飲水少少與之但以法救之或渴者○霍亂頭痛發熱身疼熱多飲水者並主之

澤瀉一兩一分　猪苓去黑皮秤　茯苓去皮秤　白朮各三分　桂枝去皮牛兩不見火

右擣篩爲散拌和每服抄三錢白湯調下此藥須各自事持秤見分兩然後合

猪苓湯（六十七）陽明病脉浮發熱渴欲飲水小便不利者○少陰病下利六七日欬而嘔渴心煩不得眠者並主之

猪苓去皮　茯苓　阿膠炙過　澤瀉　滑石各一兩

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至七分去滓温服

附子湯（六十八）少陰病得之一二日口中和背惡寒者當灸之○少陰病身體痛手足寒骨節痛脉沉者並宜服之

茯苓　芍藥各一兩半　人參一兩　白朮貳兩　附子一枚炮去皮

右剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至七分去滓温服日三服

桂枝附子湯（六十九）治傷寒八九日風濕相薄身體疼煩不能自轉側不嘔不渴脉浮虛而濇者屬太陽

桂枝貳兩　甘草一兩　附子一枚半炮去皮

右剉如麻豆大每服抄五錢匕水一盞半生薑四片棗子一枚煎至八分去滓温服

朮附湯（七十）傷寒八九日風濕相薄身體疼煩不能自轉側不嘔不渴脉浮虛而濇者桂枝附子湯主

之。若其人大便堅。小便自利者。此主之。屬太陽。

白朮貳兩。　甘草一兩炙。　附子一箇半炮去皮。

右剉如麻豆大。每服五錢匕。生薑五片。大棗一枚。水一盞半。煎至七分。去滓温服。日三服。一服覺身痹。半日許再服。三服都盡。其人如冒狀。勿怪也。卽是附子與朮並走皮中。逐水氣未得除。故使之耳。法當加桂一兩。其大便堅。小便自利。故不加桂也。

甘草附子湯（七十一）治風濕相薄。骨節疼煩。掣骨痛不得屈伸。近則痛劇。汗出短氣。小便不利。惡風不欲去衣。或身微腫者。屬太陽。

甘草炙。　白朮各一兩。　附子一枚炮去皮。　桂枝三兩、或作二兩、身腫者加防風二兩。悸氣小便不利者。加茯苓一兩半。

右剉如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。煎至七分。去滓温服。汗出卽解。

芍藥甘草附子湯（七十二）發汗病不解。反惡寒者。虛故也。此主之。

芍藥三兩。　甘草三兩炙。　附子一枚炮去皮。

右剉如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。煎至七分。去滓温服。

乾薑附子湯（七十三）下之後。復發汗。晝日煩躁不得眠。夜而安靜。不嘔不渴。無表證。脉沉微。身無大熱者。此主之。屬太陽。

乾薑一兩炮。　附子一枚生用去皮。

右剉如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。煎至七分。去滓温服。未知再服。

理中圓（七十四）霍亂頭痛。發熱身疼痛。熱多欲飲水者。五苓散主之。寒多不用水者。此主之。○大病差後。喜唾。久不了了。胸中有寒。當以丸藥温之。宜服此。屬陰陽差後勞復病脉證。

乾薑炮　甘草炙　人參腹痛者倍之　白朮各一兩

右擣篩煉蜜和丸。如雞子黃許大。以湯數合。和一圓。研碎温服之。日三、夜二服。腹中未熱。益至三四圓。熱粥飲之。微自温覆。勿揭衣。然不及湯。又方

人參　乾薑炮　甘草炙　白朮各三兩

腹痛者加人參一兩半。寒者加乾薑一兩半。渴欲得水者加白朮一兩半。臍上築者腎氣動也。去朮加桂四兩。吐多者去朮加生薑三兩。下多者還用朮。悸者加茯苓二兩。或四肢拘急。腹滿下利。或轉筋者。去白朮、加附子一枚生用。

右剉如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。日三服。

四逆湯（七十五）傷寒醫下之。續後下利清穀不止。身疼痛。急當救裏。後身疼痛清便自調者。急當救表。救裏宜四逆湯。救表宜桂枝湯。屬太陽。○自利不渴者。以其藏有寒故也。當温之。宜服。屬太陰。○傷寒脉浮自汗出。小便數。心煩微惡寒。脚攣急。與桂枝湯。得之便厥。咽乾煩躁。吐逆。作甘草乾薑湯與之。厥愈。更作芍藥甘草湯與之。其脚伸。若胃氣不和。與調胃承氣湯。若重發汗。加燒鍼者。或脉浮而遲。表熱裏寒。下利清

穀者。此並主之。○少陰病飲食入口則吐。心中溫溫欲吐。復不能吐。始得之手足寒、脉弦遲者。此胸中實。不可下也。當吐之。若膈上有寒飲乾嘔者。不可吐也。當溫之。或脉沉者。急溫之。並宜服。屬少陰。○大汗若大下利而厥冷者。或大汗出熱不去。內拘急四肢疼。又下利。厥逆而惡寒者。或下利腹滿。身疼痛者。先溫裏乃攻表。溫裏宜四逆湯。攻表宜桂枝湯。或嘔而脉弱。小便復利。身有微熱。見厥難治。此並主之。並屬厥陰。○吐利汗出發熱惡寒。四肢拘急。手足厥冷者。吐利。小便復利而大汗出。下利清穀。內寒外熱。脉微欲絕者。此主之。

甘草二兩炙。　附子一箇生用。　乾薑一兩半炮。

右剉如麻豆大。每服四錢。水一盞半。煎至七分。去滓溫服。○強人加附子半箇。乾薑加一兩半。

四逆散（七十六）少陰病四逆。其人或欬或悸。或小便不利。或腹中痛。或泄利下重者。此主之。屬少陰。

甘草炙。　柴胡　枳實去白穰炒黃。　芍藥已上各一兩。

右擣篩爲細散。米飲調下二錢。日三服。欬者加五味子。乾薑各半兩。下利悸者。加桂半兩。小便不利者。加茯苓半兩。腹中痛者。加附子半枚炮裂。泄利下重。先濃煎薤白湯。內藥末三錢匕。再煮一二沸溫服。

四逆加人參湯（七十七）惡寒脉微而利。利止者亡血也。此主之。屬霍亂。

甘草貳兩炙。　人參一兩。　附子一枚生去皮。　乾薑一兩半炮。

右剉如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓溫服。日三服。

茯苓四逆湯（七十八）治發汗。若下之。病仍不解。煩躁者。

茯苓二兩．　人參半兩．　甘草一兩炙．　乾薑七錢半．　附子半箇生去皮．

右剉如麻豆大．每服五錢．水一盞半．煎至八分．去滓温服．

當歸四逆湯（七十九）治手足厥寒．脉細欲絕者．屬厥陰．

當歸洗．　桂枝　芍藥　細辛各一兩半．　通草　甘草各一兩．炙．

右剉如麻豆大．每服五錢匕．水一盞半．棗子一枚．煎至八分．去滓温服．

當歸四逆加茱萸生薑湯（八十）有當歸四逆湯證．若其人內有久寒者．宜服．屬厥陰．

當歸洗．　桂枝去皮．　芍藥　細辛各一兩半．　甘草炙．　木通各一兩．　茱萸五兩．

右剉如麻豆大．每服五錢匕．生薑四片．大棗一枚．水一盞半．煎至八分．去滓温服．日進三服．

類證活人書卷第十五

通脈四逆湯（八十一）少陰病下利清穀裏寒外熱手足厥逆脈微欲絕身反不惡寒其人面色赤或腹痛或乾嘔或咽痛或利止脈不出者通脈四逆湯主之（屬少陰）○下利清穀裏寒外熱汗出而厥者通脈四逆湯（屬厥陰）

甘草二兩炙　乾姜三兩炮　附子大者一枚去皮破八片生用

面赤者加連鬚葱九莖腹中痛者去葱加芍藥二兩嘔者加生姜二兩咽痛去芍藥加桔梗一兩利止脈不出者去桔梗加人參二兩

右剉如麻豆大每服抄五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服未差急更作一劑其脈續續出者愈

通脈四逆加猪膽湯（八十二）吐已下斷汗出而厥四肢拘急不解脈微欲絕者通脈四逆加猪膽湯主之（屬霍亂）

甘草二兩炙　乾姜三兩　附子大者一枚生去皮　猪膽汁半合

右三味剉如麻豆大每服抄五錢匕以水一盞半煎至八分去滓內猪膽汁溫服其脈卽來

黃連湯（八十三）傷寒胸中有熱胃中有邪氣腹中痛欲嘔者黃連湯主之（屬太陽）

甘草三兩炙　黃連三兩　乾姜三兩炮　人參二兩　半夏二兩半　桂枝三兩

右剉如麻豆大。每服抄五錢匕。棗二枚。以水三盞。煎取一盞半。去滓。分二服。

黃連阿膠湯（八十四）少陰病得之二三日已上。心中煩。不得臥。黃連阿膠湯主之。

黃連一兩。　阿膠三分。　黃芩一分。　芍藥半兩。　雞子黃半箇。

右剉如麻豆大。每半劑。以水二盞。煎取一盞。去滓。內膠消盡。內雞子黃攪令勻。溫服。日二服。

黃芩湯（八十五）太陽與少陽合病。自下利者。與黃芩湯。若嘔者。黃芩加半夏生姜湯主之。○傷寒脈遲。六七日而反與黃芩湯。徹其熱。脈遲爲寒。今與黃芩湯。復除其熱。腹中應冷。當不能食。今反能食。此名除中。必死。屬厥陰。

黃芩一兩。　芍藥一兩。　甘草一兩炙。

右剉如麻豆大。每服五錢。棗子一枚。以水一盞半。煎至八分。去滓。溫服。

黃芩加半夏生姜湯（八十六）太陽與少陽合病。自下利者。與黃芩湯。若嘔者。黃芩加半夏生姜湯主之。屬太陽。

黃芩三分。　半夏二分半。　芍藥二分。　甘草二分。

右剉如麻豆大。每服五錢。生姜四片。大棗子一枚。以水二盞。煎至八分。去滓。溫服。

文蛤散（八十七）病在陽。應以汗解之。反以冷水噀之。若灌之。其熱被卻不得去。彌更益煩。肉上粟起。意欲飲水。反不渴者。服文蛤散。若不差者。與五苓散。寒實結胸無熱症者。與三物白散。龐安常云。小陷胸湯

非也。

文蛤一兩。

右一味爲散。沸湯和服方寸匕。

三物白散（八十八）寒實結胸無熱症者。與三物白散。屬太陽。

貝母三分。　桔梗三分去蘆。　巴豆去心皮。熬黑。研如脂一分。

右爲散。內巴豆研勻。以白飲和服。彊人半錢匕。羸人可減之。病在膈上必吐。在膈下必利。不利進熱粥一盃。利過不止。進冷粥一梧。身熱皮粟不解。欲引衣自覆。若以水噀之洗之。益令熱卻不得出。當汗而不汗則煩。假令汗出已。腹中痛。與芍藥三兩如上法。

十棗湯（八十九）太陽中風。下利嘔逆。表解者。乃可攻之。其人漐漐汗出。發作有時。頭痛心下痞鞕滿。引脇下痛。乾嘔短氣。汗出不惡寒者。此表解裏未和也。以十棗湯主之。

芫花炒赤熬。　甘遂　大戟各等分。

右各等分。異篩秤。末合和之。入臼中再杵。治三百下。先以水一升半。煎肥棗子一十枚。煎取八合。去滓內藥末。強人一錢匕。羸人可半錢。再單飲棗湯送下。平旦服。若下少病不除者。明日更服。加半錢。利後糜粥自養。合下不下。令人脹滿。通身浮腫而死。

抵當丸（九十）傷寒有熱。小腹滿。應小便不利。今反利者。爲有血也。當下之。不可餘藥。宜抵當丸。屬太陽。

水蛭五箇・熬去子・杵碎・水蛭再生化・爲害尤甚・須剉斷・用石灰炒過再熬・　桃仁四箇去皮尖・

大黃三分去皮淨・　䗪蟲五箇去翅足熬・

右搗篩只爲一丸以水一大白盞煎至七分頓服卒時當下血不下更作之

抵當湯（九十一）太陽病六七日表症仍在脈微而沉反不結胸其人發狂者以熱在下焦少腹鞕滿小便自利者下血乃愈所以然者以太陽隨經瘀熱在裏故也抵當湯主之○太陽病身黃脈沉結小腹鞕小便不利者爲無血也小便自利其人如狂者血證□□抵當湯主之○傷寒有熱小腹滿應小便不利今反利者爲有血也當下之不可餘藥宜抵當湯已上屬太陽・○陽明症其人喜忘者必有畜血所以然者本有久瘀血故令喜忘屎雖■大便反易其色必黑者宜抵當湯下之○病人無表裏證發熱七八日雖脈浮數者可下之假令已下脈數不解令熱則消穀喜饑至六七日不大便者有瘀血宜抵當湯主之上已屬陽明・

水蛭十枚熬去子杵碎・水蛭入腹再生化・爲害尤甚・須剉斷・用石灰炒過再熬・　大黃一兩去皮酒洗・　䗪蟲十枚去翅足熬・　桃仁七枚去皮尖搥碎用・

右剉如麻豆出作二服以水二盞煎至七分去滓溫服之

麻仁丸（九十二）趺陽脈浮而濇浮則胃氣強濇則小便數浮濇相搏大便則鞕其脾爲約麻子仁丸主之・屬陽明・

麻仁五兩・　芍藥四兩・　厚朴五寸半去皮姜汁炙・　枳實四兩炙・　杏仁二兩半去皮尖・　大黃八兩去皮淨・

右爲散。蜜和爲丸如桐子大。飲下十丸。未知益之。日進三服。

茵蔯蒿湯（九十三）陽明病發熱汗出者。此爲熱越。不能發黃也。但頭汗出。身無汗。劑頸而還。小便不利。渴引水漿者。此爲瘀熱在裏。身必發黃。茵蔯蒿湯主之。○傷寒七八日。身黃如橘子色。小便不利。腹微滿者。以茵蔯蒿湯主之。麗陽明。

茵蔯蒿嫩者一兩。　大黃三錢半去皮。　梔子大者三枚。

右剉如麻豆大。以水二大白盞。先煎茵蔯減半盞。次內二味。煎八分。去滓溫服。日三服。小便當利。尿如皂莢汁狀。色正赤。一宿腹減。黃從小便中去也。

牡蠣澤瀉散（九十四）大病差後。從腰以下有水氣者。牡蠣澤瀉散主之。陰陽易差後。勞復病脉證。

牡蠣煆。　澤瀉　蜀漆洗去腥。　商陸熬。　葶藶熬。　海藻洗去鹹。　栝蔞根各等分。

右爲散。飲服方寸匕。小便利。止後服。

竹葉石膏湯（九十五）傷寒解後。虛羸少氣。氣逆欲吐。竹葉石膏湯主之。陰陽易差後。勞復病脉症。

淡竹葉半把。　半夏六錢一字湯泡洗。　石膏四兩杵碎。　人參半兩。　甘草半兩炙。　麥門冬一兩一分去心。

嘔者加生姜一兩半。

右剉如麻豆大。每服抄五錢匕。水一盞半。入生姜四片。粳米百餘粒。煎取八分。米熟湯成。去滓溫服。

枳實梔子湯（九十六）大病差後。勞復者。枳實梔子湯主之。

枳實一枚去穰麸炒．　梔子三枚半肥者．　豉一兩五錢綿裹．

右以清漿水二盞半空煮退八分．內枳實梔子煎取九分．下豉再煎五六沸．去滓溫服．覆令汗出．若有食宿．內大黃如博棋子五六枚同煎．

白通湯（九十七）少陰病．下利脈微．白通湯主之．屬少陰．

附子一枚生用．　乾姜一兩炮．

右剉如麻豆大．每服抄五錢匕．水一盞半．入葱白四寸．煮至七分．去滓溫服．

白通加猪膽汁湯（九十八）少陰病下利．脈微者．與白通湯．利不止．厥逆無脈．乾嘔煩者．白通加猪膽汁湯主之．服湯脈暴出者死．微續者生．

猪膽半合．　乾姜半兩炮．　葱白四莖．　溺二合半．　附子半箇生去皮．

右以水一盞．煎五分．去滓．內尿膽汁．和相得分溫再服．

桃花湯（九十九）少陰病下利便膿血者．桃花湯主之．○少陰病二三日至四五日．腹痛小便不利．下利不止．便膿血者．桃花湯主之．屬少陰．

赤石脂四兩．一半碎．一半篩末用．　乾姜一分炮．

右剉如麻豆大．每服四錢．入糯米一撮．水一盞半．煎至一盞．去滓．再入赤石脂末一方寸匕．服．日進三服．若一服愈．勿再服．

吳茱萸湯。（一百）食穀欲嘔。屬陽明也。吳茱萸湯主之。得湯反劇者。屬上焦也。屬陽明。○少陰病吐利手足逆冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。乾嘔吐涎沫。頭痛者。吳茱萸湯主之。屬少陰。

人參一兩去蘆。　吳茱萸一兩陸錢五分。湯洗三遍。

右剉如麻豆大。每服四錢。生姜四片。棗子一枚。以水二盞半。煎至八分。去滓分二服。

猪膚湯。（一百一）少陰下利咽痛。胸滿心煩。猪膚湯。屬少陰。

猪膚二兩六錢半。

右一味。以水二大白盞半。煑取一盞。許。去滓加白蜜一合半。白粉一合。相和溫服。

桔梗湯。（一百二）少陰病二三日咽痛。與甘草湯不差。與桔梗湯。屬少陰。

桔梗一兩。　甘草二兩炙。

右剉如麻豆大。每服抄五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓溫分再服。

半夏散及湯。（一百三）少陰病咽中痛。半夏散及湯。屬少陰。

半夏湯洗。　桂枝去皮。　甘草炙。

右等分。各別擣篩已。令和治之。每服三錢。水一大盞。煎至八分。令冷少少嚥之。

苦酒湯。（一百四）少陰病咽中傷。生瘡。不能語言。聲不出者。苦酒湯主之。

半夏洗碎如棗核十四枚。　雞子一枚去黃。內苦酒著雞子殼中。

右二味內半夏着苦酒中以雞子殼置刀環中安火上令二三沸去滓少少含嚥之不差再服

眞武湯（一百五）太陽病發汗汗出不解其人仍發熱心下悸頭眩身瞤動振振欲擗地者眞武湯主之屬太陽○少陰病二三日不已至四五日腹痛小便不利四肢沉重疼痛自下利者此爲有水氣其人或咳或小便利或下利或嘔者眞武湯主之屬少陰

茯苓三分小便利者去茯苓　白朮二分　芍藥三分下利者去芍藥加乾姜二分　附子一枚炮去皮破八片用二片嘔者去附子加入生姜三兩

若咳者加五味子三分細辛一分乾姜一分

右剉如麻豆大每服抄五錢匕生姜四片水一盞半煎至八分去滓溫服日進三服

烏梅丸（一百六）傷寒脈微而厥至七八日膚冷其人躁無暫安時者此爲臟厥非蚘厥也蚘厥者其人當吐蚘令病者靜而復時煩者此爲臟寒蚘上入其膈故煩須臾復止得食而嘔又煩者蚘聞食臭出其人常自吐蚘蚘厥者以烏梅丸主之屬厥陰

烏梅七十五枚　細辛一兩半　乾姜二兩半　黃連四兩　當歸一兩　附子一兩半炮去皮　蜀椒出汗一兩

人參一兩半　桂枝一兩半去皮　黃蘗一兩半

右十味異擣篩合治之以苦酒漬烏梅一宿去核蒸之五升米下飯熟杵成泥和藥令相得內臼中與蜜杵二千下桐子大先食飲服十丸日進三服稍加至二十丸禁生冷滑物等

乾薑黃芩黃連人參湯（一百七）傷寒本自寒下醫復吐下之寒格更逆吐下若食入口卽吐乾薑黃芩

黃連人參湯主之。屬厥陰。

乾薑三分炮。　黃芩三分。　黃連三分。　人參三分。

右剉如麻豆大。每服抄五錢。水一盞半。煎至八分。去滓溫服。

白頭翁湯（一百八）熱利下重者。白頭翁湯主之。○下利欲飲水者。以有熱也。白頭翁湯。已上屬厥陰。

白頭翁一兩。　黃蘗一兩半。　秦皮一兩半。　黃連一兩半。

右剉如麻豆大。分五服。以水二大盞。煎至八分。去滓溫服。不差再服。

赤石脂禹餘糧湯（一百九）傷寒服湯藥下利不止。心下痞鞕。服瀉心湯已。復以他藥下之。利不止。醫以理中與之。利益甚。理中治中焦。此利在下焦。赤石脂禹餘糧湯主之。復不止者。當利其小便。屬太陽。

赤石脂四兩。　禹餘糧四兩。

右剉碎。每服抄五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓溫服。

旋復代赭湯（一百十）傷寒發熱。若吐若下。解後心下痞鞕。噫氣不除者。旋復代赭湯主之。屬太陽。

旋覆花三分。　人參半兩。　代赭石一分。　甘草三分炙。　半夏三分洗。湯

右剉如麻豆大。每服抄五錢匕。生姜四片。棗子一枚。煎至八分。去滓溫服。

瓜蒂散（一百十一）病如桂枝症。頭不痛。項不強。寸脈微浮。胸中痞鞕。氣上衝喉咽不得息者。此爲胸有寒也。當吐之。宜瓜蒂散主之。屬太陽。

瓜蒂熬黃。　赤小豆各半兩。

右各擣篩已。合治之。取一錢匕。豉一合。湯七合。先漬之。須臾煮作稀糜。去滓取汁。和散温頓服。不吐少少加。得快吐乃止。諸亡血虛家不可與之。

蜜煎導湯（一百十二）陽明病。自汗出。若發汗小便自利者。此爲津液內竭。雖鞕不可攻之。當須自欲大便。宜蜜煎導而通之。若土瓜根及大猪膽汁皆可爲導。

蜜四兩。

右一味內銅器中微火煎之。稍凝如飴狀。攪之勿令焦。看欲可丸。捻作挺如指許。長二寸。當熱時急作。令頭銳。內穀道中。以手急抱。欲大便時。乃去之。

猪膽汁方

用大猪膽一枚。瀉汁。和法醋少許。以灌穀道中。如有一食頃。當大便。

燒裩散（一百十三）傷寒陰易之爲病。其人身體重。少氣。小腹裏急。或引陰中拘攣。熱上衝胸。頭重不欲舉。眼中生花。膝脛拘急者。燒裩散主之。

婦人裩襠燒灰。

右一味以水和服方寸匕。小便利。陰頭腫卽愈。

類證活人書卷第十六

此一卷載雜方。大率仲景證多而藥少。使皆如仲景調理既正。變異不生。則麻黃桂枝青龍用之而有餘。以後世望聖人難矣。仲景藥方缺者甚多。至如陰毒傷寒、時行溫疫、溫毒、發斑之類。全無方書。今採外臺千金聖惠金匱玉函補而完之。凡百有餘道。以證合方。以方合病。雖非仲景筆削。然皆古名方也。譬猶周易參同。華嚴合論。步驟馳騁。不外乎聖人之意。又況俗學久矣。一旦革之。悉用古法。卽陽春白雪復生謗毀。適足以杜絕治法。今撥歸經絡。裁減湯劑。參以雜方。庶幾庸人易曉。日就月將。辛甘發散。酸苦湧泄之術行。卽俗方不革而自寢矣。此余所以載雜方之意也。又況五積散、敗毒散、升麻湯、萎蕤湯之類。縱治不對病。用之或差。亦無所害。載之卷末。以俟采擇。

（升麻湯）（一）治傷寒中風頭痛。憎寒壯熱。支體痛。發熱畏寒。鼻乾不得睡。兼治小兒大人瘡癰已發未發。皆可服。兼治寒暄不時。人多疾疫。乍暖脫着。及暴熱之次。忽變陰寒。身體疼痛。頭重如石者。

升麻　白芍藥　甘草炙。　乾葛各等分。

右剉如麻豆大。每服五錢。以水一盞半。煎至八分。去滓溫服。若太段寒卽熱服。若熱卽溫服。瘡疹亦准此。服藥已。身涼止藥。小兒量度多少服。如老兒喫。去芍藥。加柴胡一兩。人參半兩。雪白芍藥一分。

（防風白朮牡蠣湯）（二）治發汗多。頭眩汗出。筋惕肉瞤。

防風獨莖者去蘆頭。　牡蠣粉炒黃。　白朮等分。

右搗羅爲細末。每服二錢。以酒調下。米飲亦得。日進二三服。汗止。便服小建中湯。

（李根湯）（三）治氣上衝。正在心端。

半夏湯洗半兩。　當歸一分。　芎藭一分。　茯苓一分。　桂枝一兩。　黃芩一分。　甘草炙一分。　甘李根白皮二合。

右剉如麻豆大。每服抄五錢匕。生姜四片。水一盞半。煎至八分。去滓溫服。

（大橘皮湯）（四）動氣在下。不可發汗。發汗則無汗。心中大煩。骨節疼痛。目運惡寒。食則反吐。穀不得入。先服大橘皮湯。吐止後。服小建中湯。

橘皮一兩半去白。　甘草炙半兩。　人參一分。　竹茹半升。

右剉如麻豆大。每服五錢。生姜四片。棗子一枚。以水二鍾。煎取一盞。去滓分二服。

（橘皮竹茹湯）（五）治噦逆。

橘皮二兩。　竹茹一升。　甘草二兩炙。　人參半兩。　半夏一兩湯洗。

右剉如麻豆大。每服五錢。生姜六片。棗子一枚。以水二大盞。煎至一盞。去滓溫服。日進三服。

（生姜橘皮湯）（四）治乾嘔噦。若手足厥冷者。

橘皮四兩。　生姜半斤。

右剉如麻豆大。水七盞。煎至三盞。去滓温服一盞。

（陰旦湯）（六）治傷寒肢節疼痛。內寒外熱。虛煩。

芍藥二兩。　甘草二兩炙。　乾姜三兩炮。　黃芩三兩。　桂四兩。

右剉如麻豆大。每服抄五錢。棗二枚。水一盞半。煎至八分。去滓温服。日三夜二。

（陰毒甘草湯）（七）治傷寒初得病一二日。便結成陰毒。或服藥六七日已上。至十日。變成陰毒。身重背強。腹中絞痛。咽喉不利。毒氣攻心。心下堅強。短氣不得息。嘔逆。脣青面黑。四支厥冷。其脈沉細而疾。仲景云。此陰毒之候。身如被杖。喉咽痛。五六日可治。至七日不治。

甘草炙。　升麻　當歸各二分。　雄黃一分。　桂枝去皮二分。　鱉甲一兩半醋炙秤。　蜀椒一分。出汗閉口者及子去之。

右剉如麻豆大。每服抄五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓服。如人行五里頃。更進一服。温覆取汗。毒當從汗出。汗出卽愈。若未汗再作。

（白朮散）（八）治陰毒傷寒。心間煩躁。四肢逆冷。

白朮一兩。　細辛一兩。　附子一兩炮去皮臍用。　桔梗一兩去蘆頭。　乾姜半兩炮裂剉。　川烏頭一兩炮裂去皮臍

右件藥。擣爲細末。每服二錢。以水一中盞。煎至六分。不計時候。稍熱和滓頓服。

（附子散）（九）治陰毒傷寒。脣青面黑。身背強。四肢冷。

附子三分炮裂去皮。　桂心半兩。　當歸半兩剉微炒。　乾姜一分炮裂剉。　半夏一分湯洗七次去滑。　白朮半兩。

右件擣篩爲細散。每服三錢。以水一中盞。入生姜半分。煎至六分。去滓。不計時候。熱服。衣覆取汗。如人行十里。未汗再服。

（正陽散）（十）治陰毒傷寒。面青。張口出氣。心下硬。身不熱。只額上有汗。煩渴不止。舌黑多睡。四支俱冷。

甘草一分炙微赤剉。　附子一兩炮裂去皮臍。　麝香一錢研細入。　乾姜一分炮裂剉。　皂莢一挺去皮塗酥炙令黃色去子。

右件擣羅爲細末。每服二錢。以水一中盞。煎至五分。不計時候。和滓熱服。

（肉桂散）（十一）治傷寒服冷藥過度。心腹脹滿。四肢逆冷。昏沉不識人。變爲陰毒。

肉桂三分去皺皮。　赤芍藥一兩。　陳橘皮一兩。　前胡一兩去蘆頭。　附子一兩炮裂去皮臍。　當歸一兩。

白朮三分。　高良姜三分剉。　人參一兩去蘆頭。　吳茱萸半兩湯浸。　厚朴三分去皮姜汁炙令香熟。　木香三分。

右件擣爲粗末。每服四錢。以水一中盞。入棗子三枚。煎至六分。去滓。不計時候。稍熱頻服。

（回陽丹）（十二）治陰毒傷寒。面青手足逆冷。心腹氣脹。脈候沉細。宜此治之。

硫黃半兩細研入。　木香半兩。　蓽澄茄半兩。　附子半兩炮裂去皮臍。　乾姜一分炮裂剉。　乾蠍半兩。

吳茱萸半兩浸七遍焙乾微炒。

右件藥擣羅爲細末。酒煮麵糊爲丸。如梧桐子大。每服不計時候。以生姜湯下三十丸。頻服二服。復以熱酒一盞投之。以厚衣蓋取汗。

（返陰丹）（十三）治陰毒傷寒心神煩躁。頭痛。四支逆冷。

硫黃五兩．　太陰玄精石二兩另研．　硝石二兩另研用．　附子炮裂去皮臍．　乾姜炮裂剉．　桂心已上各半兩．

右件藥用生鐵銚先鋪玄精末一半次鋪消石末一半中間下硫黃末又着消石蓋硫黃都以玄精蓋上訖用小盞合着以三斤炭火燒令得所勿令煙出多急取瓦盆合着地面四向著灰蓋勿令煙出直候冷取出細研如麵後三味擣羅爲末與前藥同研令勻用軟飯和丸如梧桐子大每服十五丸至二十丸煎艾湯下頻服汗出爲度病重則三十丸此方甚驗喘促與吐逆者入口便住又服此方藥三五服服之不退便於臍下一寸灸之須是大段日夜不住手灸不限多少壯數灸之仍艾炷勿令小小則不得力若其人手足冷小腹硬即須更於臍下兩邊各一寸各安一道三處臍下灸仍與當歸四逆湯幷返陰丹亦須頻服內外通透方得解退若遲慢即便死矣又若是陰症加以小便不通及陰囊縮入小腹絞痛欲死者更於臍下二寸石門穴大段急灸之仍須與返陰丹當歸四逆加吳茱萸生姜湯慎勿與尋常利小便藥也尋常利小便多是冷滑藥此是陰毒氣在小腹所致也世有醫者見小便不通便用炒鹽及裹熱藥於臍下便熨欲望小便通緣陰氣在小腹之間致被熱物熨着无處出得即便奔上衝心往往有死者

(天雄散)(十四)治陰毒傷寒身重背強腹中疠痛咽喉不利毒氣攻心心下堅強短氣嘔逆脣青面黑四肢厥冷其脈沉細而疾

天雄一兩炮裂去皮臍．　麻黃半兩去根節．　當歸半兩切微炒．　白朮半兩．　肉桂一兩去粗皮．　半夏半兩湯泡洗七次去滑．

陳橘皮三分湯浸去白瓤炒　乾姜三分炮　川椒一分去目及閉口者微炒去汗　厚朴一兩去粗皮塗生姜汁炙令香熟

右件藥擣爲粗末每服五錢以水一大盞入生姜半分棗子三枚煎至五分去滓不計時候稍熱服如人行十里未汗再服

（續添）正元散　退陰散出百問方

（正元散）治傷寒如覺傷寒吹着四肢頭目百骨節疼痛急煎此藥服如人行五里再服或連進三服出汗立差若患陰毒傷寒入退陰散半錢同煎或傷冷傷食頭昏氣滿及心腹諸疾服之無有不取効者

麻黃去節秤　陳皮　大黃生用　甘草炙　乾姜炮用　肉桂去皮　芍藥　附子炮去皮用

茱萸湯洗焙炒　半夏洗各等分

右麻黃加一半茱萸減一半同爲末每服一大錢水一盞生姜三片棗一枚煎至七分熱服如出汗以衣被蓋覆切須候汗乾去衣被如是陰毒不可用麻黃免更出汗

（退陰散）治陰毒傷寒手足逆冷脈沉細頭痛腰重連進三服小小傷冷每服一字入正元散內同煎入鹽一捻陰毒傷寒欬逆煎一服細細熱呷便止

川烏　乾姜各等分

右爲粗末炒令轉色放冷再擣爲細末每服一錢水一盞鹽一捻煎半盞去滓溫服

（葱熨法）（十五）治氣虛陽脫。體冷無脈。氣息欲絕。不省人。及傷寒陰厥。百藥不効。葱以索纏如繩許大。切去根及葉。唯存白長二寸許。如大餅餤。先以火煬一面令通熱。又勿令灼人。乃以熱處搭病人臍連臍下。其上以熨斗滿貯火熨之。令葱餅中熱氣鬱鬱入肌肉中。須預作三四餅。一餅壞。不可熨。又易一餅。良久病人當漸醒。手足溫。有汗即差。更服四逆湯。輩溫其內。昔曾有患傷寒冥冥不知人。四體堅冷如石。藥不可入。用此遂差。

（葶藶苦酒湯）（十六）治傷寒七八日內熱不解。

苦酒米醋是也一升半。　生艾汁半升。無生艾煮熟艾汁或用艾根搗取汁用。　葶藶熬杵膏一合。

右煎取七合作三服。

（陽毒升麻湯）（十七）治傷寒一二日便吐陽毒。或服藥吐下之後。變成陽毒。腰背痛。煩悶不安。面赤狂言。或走。或見鬼。或下利。脈浮大數。面赤斑斑如錦紋。喉咽痛。下膿血。五日可治。七日不可治也。

升麻二分。　犀角屑一分。　射干一分。　黃芩一分。　人參一分。　甘草一分。

右剉如麻豆大。以水三升煎取一升半。去滓。飲一湯盞。食頃再服。溫覆。手足出汗。汗出則解。不解重作。

（大黃散）（十八）治陽毒傷寒未解。熱結在內。恍惚如狂者。

川大黃一兩半切。　桂心三分。　甘草一兩炙微赤。　川芒硝二兩。　木通一兩切。　大腹皮一兩切。　桃仁二十一枚湯浸去皮尖雙仁麸炒令微黃。

右件擣爲粗末。每服四錢。以水一中盞。煎至六分去滓。不計時候。温服。以通利爲度。

（梔子仁湯）（十九）治陽毒傷寒。壯熱百節疼痛。

梔子仁一兩。　柴胡一兩半去苗。　川升麻二兩。　黄芩二兩。　赤芍藥一兩。　大青一兩。

石膏二兩。　知母一兩。　甘草半兩炙剉。　杏仁二兩。湯浸去皮尖。雙仁者麩炒微黄。

右件擣爲麄末。每服抄四錢。以水一中盞。入生姜半分。豉一百粒。煎至六分去滓。不計時候。温服。

（黑奴丸）（二十）時行熱病。六七日未得汗。脈洪大。或數。面赤目瞪。身體大熱。煩躁狂言欲走。大渴甚。又五六日已上不解。熱在胸中。口噤不能言。爲壞傷寒。醫所不治爲死。或人精魂已竭。心下纔暖。發開其口。灌藥下咽。即活。兼治陽毒及發斑。

大黄二兩。　釜底煤研入。　黄芩　芒硝　竈突墨研入。　梁上塵　小麥奴各一兩。

麻黄去節泡一二沸焙乾秤三兩。

右件擣羅爲細末。煉蜜爲丸。如彈子大。以新汲水研下一丸。渴者但與冷水盡足飲之。須臾當寒。寒竟汗出便差。若日移五尺不汗。依前法服一丸。差即止。須微利。小麥奴乃小麥未熟時。叢中不成麥。捻之成黑勃是也。無此亦得。此藥須是病人大渴倍常。燥盛渴者。乃可與之。不渴若與之。翻爲禍耳。

（五積散）（二十一）治陰經傷冷。脾胃不和。及感寒邪。

枳殼五兩麩炒令色黄熟。　官桂去皮二兩。　厚朴三兩去皮淨。　人參二兩。　吳白芷四兩洗淨焙乾。　白茯苓三兩。

芍藥三兩洗淨。　當歸三兩洗。　麻黃去節三兩。　半夏三兩湯洗七遍。　川芎二兩。　陳橘皮八兩洗不去穰。
甘草二兩半。　乾姜三兩。　蒼朮二十四兩。新者淨洗焙乾。　桔梗十二兩。緊實白者洗淨焙乾。

右件除枳殼肉桂外其餘並一處生搗爲粗末分作六分於大鑊內用文武火炒令黃熟不得焦用紙攤於板床候冷入前件枳殼官桂末一處和勻入瓷合盛每服二錢水一盞生姜三片同煎至七分去滓服傷寒入葱白一莖豆豉七粒同煎連服出汗或脾胃不和內傷冷食渾身疼痛頭昏無力胸膈不利喫食不下氣脈不和四支覺冷至晚心躁困倦卽入鹽少許同煎或是陰經傷寒手足逆冷或睡裏虛驚及虛汗不止脈細疾面青嘔逆更宜入附子同煎加減多少並在臨時

（霹靂散）（二十二）治陰盛隔陽煩躁不飲水

附子一枚及半兩者炮熟取出用冷灰焙之去皮臍爲粗末眞臘茶一大錢細研同和分作二服每服用水一盞煎六分臨熟入蜜半匙放溫冷服之須臾躁止得睡汗出卽差

（火焰散）（二十三）治傷寒惡候

舶上硫黃　黑附子去皮生用。　新臘茶已上各一兩爲細末。

右先用好酒一升調藥分大新椀五口中於火上攤蕩令乾合於瓦上每一椀下燒熟艾一拳大以瓦擔起無令火着直至煙盡冷卽刮取卻細研入藝合盛每服二錢酒一盞共煎七分有火焰起勿訝傷寒陰毒者四肢冷脈沉細或吐或瀉五心躁煩胸中結硬或轉早伏陽在內湯水不得下或無脈先喫

一服。如吐卻更進一服。後心中熱。其病已差。下至臟腑中表未解者。渾身壯熱。脈氣洪大。便宜用發表藥。或表解者。更不發熱。便得眠睡。渾身有汗。方可用調氣湯散。如服此藥二服不應。勿治之也。

（丹砂丸）（二十四）治傷寒陰陽二毒相伏。危惡形證。

舶上硫黃　水銀　太陰石　太陽石　玄精石已上各一兩研。　硝石半兩。

右件藥爲末。先用無沖銚子。以文武火炒。下諸藥末。令勻。如灰色。研如粉麵。生薑自然汁浸蒸餅爲丸。如菉豆大。每服五丸。龍腦牛黃生薑蜜水下。壓躁也。若陽毒。棗湯下。陰毒荏湯下。不得於屋底炒。

類證活人書卷第十七

（五味子湯）（二十五）治傷寒喘促。脈伏而厥。

人參一分。　五味子半兩。　麥門冬去心一分。　杏仁去皮尖一分。　橘皮去白一分。

右剉如麻豆大。入生薑十片。棗子三枚。以水三大白盞。煎至一盞半。去滓分二服。

（豭鼠糞湯）（二十六）療傷寒病後。男子陰易方。

韭根一大把。　豭鼠糞十四枚。

右二味。以水二升。煎取半升。去滓再煎。三沸溫溫盡服。必有粘汗出爲効。未汗再作服。亦理諸般勞復。

鼠屎兩頭尖者是也。

（竹皮湯）（二十七）療交接勞復。卵腫腹中絞痛欲絕。

刮竹青皮一升。

右一味。以水三升。煮一升半。絞去滓。分服立愈。

（續添乾姜湯）出百問方。　療婦人得溫病。雖差半復。未滿一百日。不可與交合。交合爲陰易之病。病必拘急。手足拳。皆死。丈夫病以傷婦人名爲陽易。速當療之。可差。滿一百日不可療也。宜令服此藥。

乾薑一分炮。

右剉如麻豆大。水二盞。煎六分。温服。汗出得解止。手足伸遂愈。

（續添青竹茹湯）出百問方。婦人病未平復。因有所動。致熱氣上衝胸。手足拘急搐搦。如中風狀方。

栝樓根無黃根者二兩。　青竹茹刮半升淡竹者。

右以水二升半。煮取一升二合。去滓。温温作二三服。喫。立有効。

（續添當歸白朮湯）出百問方。婦人未平復。因有所動。小腹急痛。腰胯疼。四肢不任舉。身無熱發者。

白朮一分。　當歸一分。　桂枝一分去皮。　附子一枚破分八片去皮。　生薑半兩。　甘草一分炙。　芎藭一分。

人參一分。　黃蓍一分蜜。

右剉如麻豆大。以水三升。煮取一升半。去滓。通口服一湯盞。食頃再服一湯盞。温服。微汗便差。

（知母麻黃湯）（二十八）傷寒差後。或十數日。或半月二十日。終不惺惺。常昏沉。似失精神。言語錯謬。又無寒熱。醫或作鬼祟。或作風疾。多般治不差。或朝夕潮熱。頰赤。或有寒熱。似瘧。都是發汗不盡。餘毒在心胞絡之間所致。

知母一兩半。　麻黃去節。　甘草炙。　芎藭　黃芩各半兩。　桂枝去皮半兩。盛暑可減作一分。

右剉如麻豆大。每服抄五錢。以水一盞半。煎八分。去滓。温服。半日可相次二三服。温服令微汗。若心煩不眠。欲飲水。當稍稍與之。令胃中和。即愈。未汗須再服之。

（繁甲散）（二十九）傷寒八九日不差。名曰壞傷寒。不能治者。宜此療之。

升麻　前胡去蘆　烏梅去核　枳實麩炒去白　犀角鎊　黃芩各半兩　生地黃切兩合

甘草一分炙　鱉甲去裙米醋炙赤黃杵碎用半兩

右剉如麻豆大每服抄五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服

（人參順氣散）（三十）治傷寒頭疼增寒壯熱四肢疼痛

麻黃去節秤一兩半　乾葛一兩　白朮一兩　甘草一兩炙　桔梗去蘆一兩　人參一兩　白姜半兩炮

香白芷一兩

右擣羅爲細末每服三錢水一大盞生姜三片葱白二寸煎至八分通口服如要出汗連進二服

（蒼朮散）（三十一）治傷寒一二日頭疼發熱憎寒身體疼痛

麻黃一兩湯洗過焙乾秤　蒼朮半兩米泔浸去皮切　石膏一兩煅　桔梗半兩　甘草半兩炙　山茵蔯半兩去梗

右爲細末每服二錢水一盞煎至八分連服出汗

（麻黃葛根湯）（三十二）治傷寒一日至二日頭項及腰脊拘急疼痛渾身煩熱惡寒

麻黃用沸湯泡一二次焙乾秤　芍藥各三兩　乾葛四分　葱白七莖　豉一合

右剉如麻豆大每服四錢水一盞半煎一中盞去滓溫服服了以厚衣蓋覆如人行四五里間再服良久如未得汗出更煮葱粥少許熱投之取汗

（敗毒散）（三十三）治傷風溫疫風濕頭目昏眩四肢痛憎寒壯熱項強目睛疼尋常風眩拘倦風痰皆

服神効。

羌活洗去土。　獨活去蘆。　前胡去蘆。　柴胡去苗。　芎藭　枳殼麩炒去穰。　白茯苓去皮。

桔梗去蘆頭。　人參已上各一兩。　甘草半兩炙。

右件擣羅爲末。每服三錢。入生姜二片。水一盞。煎七分。或沸湯點亦可。老人小兒亦宜。日三二服。以知爲度。瘴煙之地。或溫疫時行。或人多風痰。或處卑濕脚弱。此藥不可闕也。

（獨活散）（三十四）治傷風溫瘴等疾。

羌活去蘆頭。　獨活去蘆頭。　人參　細辛去灰土華陰者佳。　白茯苓去皮。　枳殼去心麩炒通黃用。　防風去蘆。

黃芩細堅者。　麻黃沸湯泡三次焙乾秤。　甘草細剉炒赤。　蔓荊子　甘菊花已上各一兩。　石膏水飛過二兩。

右十三味。擣羅爲末。每服三錢。水一盞。生姜三片。薄荷四五葉。同煎至七分。去滓。微熱呷。如年高者。以川芎代黃芩。

（桂枝石膏湯）（三十五）治傷寒三日外。與諸湯不差。脈勢仍數。邪氣猶在經絡。未入臟腑者。桂枝石膏湯。此方可夏至後代桂枝證用。若加麻黃去節半兩。可代麻黃青龍湯用之也。有汗脈緩爲桂枝證。無汗脈緊爲麻黃青龍證。

桂枝半兩去皮。　石膏二兩碎。　黃芩半兩。　甘草半兩。　梔子四枚。小者可用八枚。　白藥子　升麻三分。

乾葛三分。

右剉如麻豆大。每服抄五錢匕。生姜四片。水一盞半。煎取八分去滓。食頃再服。若得汗卽停後服。

（梔子升麻湯）（三十六）治晚發傷寒。三月至夏爲晚發。

梔子十枚切碎。　升麻一兩半。　生地黃半斤切碎用。　柴胡去蘆。　石膏各二兩半。

右剉如麻豆大。每服抄五錢匕。水一盞半。煎至八分去滓。頻服。病不解更作。若頭回赤。去石膏。用乾葛二兩。無地黃。用豉代之。

（橘皮湯）（三十七）治傷暑痰逆惡寒。

甘草半兩。　人參一分。　陳橘皮去白二兩。

右爲粗末。每服五錢。用青新季竹。輕輕刮上面青茹一圍。姜四片。棗一枚。水一盞半。煎至八分。去滓熱服。如不惡寒。卽宜竹葉湯。

（解肌湯）（三十八）治傷寒溫病。天行頭痛。壯熱。

葛根一兩。　黃芩半兩。　芍藥半兩。　甘草一分炙。　桂心一分。　麻黃三分去節湯泡二沸焙乾用。

右六味。剉如麻豆大。每服抄五錢匕。水一盞半。棗子一枚。煮取八分去滓。日三服。三四日不解。脈浮者。宜重服。發汗。脈沉實者宜下之。

（小柴胡加桂湯）（三十九）治瘧疾先寒後熱。兼治支結。

柴胡八兩。　人參　甘草炙。　半夏湯浸七次切。　黃芩　桂去皮。已上各三兩。

右剉如麻豆大每服抄五錢匕水一盞半生姜七片棗二枚煎至八分去滓取六分清汁温服日三夜二若渴者去半夏加人參栝樓根同煎服之

（白虎加桂湯）（四十）治瘧疾但熱不寒者

知母六兩　甘草炙二兩　石膏一斤　粳米二合　桂去皮秤三兩

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎八分去滓服

（柴胡桂姜湯）（四十一）治寒多微有熱或但寒不熱亦治勞瘧之證

柴胡四兩　黄芩一兩半　桂枝一兩半去皮　栝樓根二兩　牡蠣杵碎炒　甘草炙　乾姜各二兩

右七味剉如麻豆大每服抄五錢水一盞半煎至一盞去滓温服初服微煩汗出愈

（瘧母煎）（四十二）治久瘧不愈結爲癥瘕寒熱

鱉甲十二分炙　黄芩三分　烏扇三分燒存性用　柴胡去苗陸兩　鼠婦三分炒　乾姜炮三分　大黄三分

芍藥五分　肉桂三分去皮　葶藶二分炒　石葦二分去毛　紫葳三分　人參一分　厚朴三分炙

牡丹皮五分　瞿麥二分　䗪蟲五分炒　阿膠炒　蜂窠各四分炒　朴硝十二分　蜣螂六分炙

半夏洗一分　桃仁二分去皮尖

右擣羅爲末鍛竈下灰一斗清酒一斗五升浸灰候酒盡一半着鱉甲於中煮令泛爛如膠漆絞取汁內諸藥煎爲丸如梧桐子大空心服七丸日三服有一方無鼠婦朴硝加海藻三分大戟一分

（祛邪丸）（四十三）治瘧疾脈浮大寒熱往來用此吐之衞州書云瘧寒多熱少者痰多也然寒多熱少而脈浮則痰無疑矣可吐之也若脈遲微者惡寒瘧耳宜用柴胡桂姜湯

恆山　甘草炙　大黃　知母各二兩　麻黃四兩去節湯泡二沸焙乾秤用

右擣羅爲末煉蜜爲丸如梧桐子大每服十五丸面向東清淨水呑下

（猪膽雞子湯）（四十四）治傷寒五六日斑出者

猪膽三合　雞子一枚　苦酒三合

右三味和合煎三沸強人盡服羸人煎六七沸服汗出卽差

（萎蕤湯）（四十五）治風濕兼療冬溫及春月中風傷寒發熱頭眩痛喉咽乾舌強胸內疼痞滿腰背強

萎蕤三分　石膏一兩杵碎　白薇半兩　麻黃半兩湯泡焙乾秤　川芎半兩　葛根半兩生者可用二兩尤佳

大羌活去蘆半兩　甘草炙半兩　杏仁去皮尖雙仁者搥碎半兩　青木香一分冬一兩始春用半兩炒

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎一盞日三四服

（知母乾葛湯）（四十六）治風濕身體灼熱甚者

知母三錢　乾葛八錢　石膏六錢　甘草二錢炙　黃芩二錢　木香二錢　升麻二錢　萎蕤五錢

天南星二錢生　人參二錢　防風二錢　麻黃去節四錢湯泡焙秤　杏仁二錢炒　川芎二錢　羌活二錢

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至一盞去滓服未知再服之

（栝樓根湯）（四十七）治風溫加渴甚者。

栝樓根三分。　石膏二兩。　人參半兩。　防風半兩。　甘草半兩炙。　葛根一兩半生用。乾者只三錢。

右剉如麻豆大。每服抄五錢匕。用水一盞半。煎至一中盞。去滓溫服。

（漢防己湯）（四十八）治風溫脈浮身重汗出者。

漢防己四兩。　甘草二兩炙。　黃蓍二兩蜜炙用。　白朮三兩。

右剉如麻豆大。每服五錢匕。生姜四片。大棗一枚。水一盞半。煎取一中盞。去滓飲訖。仍坐被中。汗出如蟲行。或被臥取其汗。

（老君神明散）（四十九）

白朮二兩。　桔梗一兩。　附子二兩炮去黑皮用。　烏頭四兩炮去皮臍。　眞華陰細辛一兩。

右五味搗粗篩。縫絹囊盛帶之。居閭里皆無病。若有疫癘者。溫酒服方寸匕。覆取汗。得吐卽差。若經三四日。抄三寸匕。以水二碗煮。令大沸分三服。

（務成子螢火丸）（五十）主辟疾疫惡氣百鬼虎狼蛇虺蜂蠆諸毒。五兵白刃。盜賊凶害。皆辟之。

螢火　鬼箭羽削取皮　蒺藜各一兩。　雄黃　雌黃　礬石各二兩燒汁煮。　羖羊角　鍛竈灰

鐵錘柄入鐵處燒焦各一兩半。

右九味搗篩爲散。以雞子黃幷丹雄雞冠一具和之。如杏仁大。作三角絹囊盛五丸。帶左臂。仍更掛戶

上。

續添　聖散子方此藥性溫。若陽證有熱。不可輕服之。

（聖散子）蘇內翰云。昔嘗覽千金三建散方。於病無所不治。而孫思邈特爲著論。以謂此方用藥節度。不近人情。至於救急。其驗特異。乃知神物効靈。不拘常制。至理開感。智不能知。今予所謂聖散子者。殆此類也。自古論病。惟傷寒爲至危急。表裏虛實。日數證候。應汗下之類。差之毫釐。輒至不救。若時毒流行。用聖散子者。一切不問陰陽之感。連服取差。不可與傷寒比也。若疾疫之行。平旦輒煑一釜。不問老幼良賤。各一大盞。卽時不入。其間平居無病。能空腹一服。則飲食快美。百病不生。濟世衞家之寶也。其方不知其所從出。而故人巢君世寶之。以治溫疫。百不失一。予旣得之。謫居黃州。連年大疫。所全活者。不可勝數。巢君初甚惜此方。指江水爲盟。約不傳人。余切隘之。以傳蘄水道人龐安常。龐以醫聞於世。又善著書。故以授之。且使巢君之名與此方聞不朽。東坡居士序。

草豆蔻十枚去皮麵裹煨。　木猪苓去皮。　石菖蒲　茯苓　高良姜

獨活去蘆頭。　附子炮去皮臍。　麻黃去根節。　厚朴去皮姜汁炙。　藁本去沙土。

芎藭　枳殼去根麩炒。　柴胡去蘆頭。　澤瀉　細辛華陰者。一兩半炙。

防風去蘆頭。　白朮　藿香　半夏姜製各半兩。　甘草

右剉如麻豆大。每服五錢。水一盞半。煑取八分。去滓熱服。餘滓兩服。合爲一服重煎。空心服之。

（調中湯）（五十一）治夏月初秋。忽有暴寒折於盛熱。熱結於四肢。則壯熱頭痛。寒傷於胃則下利。或血、或赤、或赤。壯熱迷悶。脈數。宜下之。

大黃去皮三分。　葛根　黃芩　芍藥　桔梗去蘆。
藁本眞者無。則以芎代之。　茯苓去皮。　白朮　甘草炙。已上各半兩。

右剉如麻豆大。每服五錢。水一盞半。煑取一中盞。移時再服之。得快利。壯熱便歇。小兒輩減與服之。凡秋夏旱熱積日。或有暴寒折之。熱無可散。喜搏着肌中。作壯熱氣也。胃爲六腑之表。最易爲暴寒傷之而下也。虛冷人亦不壯熱。但下利或霍亂也。不宜服此。少實人可服。五石人喜壯熱。適與藥斷下。則加熱喜悶而死矣。亦不止便作痹熱毒壯熱甚不歇則劇。是以宜調中湯下和其胃氣也。調中湯去大黃。卽治風溫證。兼治陽病因下遂協熱利不止。及傷寒不因下自利。表不解而脈浮數者。皆可去大黃煎之。殊驗也。

（射干湯）（五十二）治初秋夏月暴雨冷。及天行暴寒。其熱喜伏於內。欬嗽曲折不可得氣息。喉啞失聲。乾嗽無唾。喉中如哽。

射干二兩。　半夏五兩洗。　杏仁三兩去皮尖雙仁炒。　生姜四兩炮。　甘草二兩炙。
紫菀二兩。　肉桂二兩。　枳實二兩炙。　當歸二兩。　橘皮二兩。
獨活二兩。　麻黃二兩去節湯泡焙秤。

右剉如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。

（半夏桂枝甘草湯）（五十三）治伏氣之病。謂非時有暴寒中人。伏氣於少陰經。始不覺病。旬月乃發。脈便微弱。法先咽痛。似傷寒非咽痹之病。次必下利。始用半夏桂枝甘草湯主之。次四逆散主之。此病只二日便差。古方謂之腎傷寒也。

甘草炙。　半夏湯洗。　桂心

右等分剉如麻豆大。每服四錢匕。水一盞半。煎至七分。放冷少少含細嚥之。入生薑四片煎服。

（麻黃杏子薏苡甘草湯）（五十四）病人一身盡疼。發熱日晡所劇者。名風濕。此病因傷於汗出當風。或久傷取冷所致之也。

麻黃去節秤湯泡二分。　甘草一分炙。　薏苡仁半兩。　杏仁十枚去皮尖炒。

右剉如麻豆大。每服四錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓。有微汗。温服避風。

（防己黃蓍湯）（五十五）治風濕。脈浮身重。汗出惡風。

防己一兩。　甘草半兩炙。　白朮三分。　黃蓍一兩一分去蘆。

右剉如麻豆大。每服抄五錢匕。生姜四片。大棗一枚。水一盞半。煎至八分。去滓温服。良久再服。喘者加麻黃半兩。胃中不和者。加芍藥三分。氣上衝者。加桂枝三分。下有陳寒者。加細辛三分。服後當如蟲行皮中。從腰下如冰。後坐被上。又以一被繞腰以下温令微汗差。

（杏仁湯）（五十六）療風濕身體疼痛惡風微腫

桂心二兩　麻黃一兩去節湯泡焙秤用　芍藥一兩　天門冬一兩去心　杏仁二十五枚去皮尖雙仁炒

右剉如麻豆大每服五錢七生姜四片水一盞半煎至八分去滓溫服

（小續命湯）（五十七）治中風及脚氣痹弱不能轉側者又兼治小兒慢驚風

附子生削去皮臍五錢　防風一兩半　芍藥　白朮　人參　川芎　麻黃去節湯泡三次焙乾　防己　黃芩　桂枝　甘草各一兩

右剉如麻豆大每服五錢七水一盞半煎至一盞去滓取八分清汁入生姜汁再煎一二沸溫服日三夜二若柔痓自汗者去麻黃夏間及病有熱者減桂枝一半冬及始春去黃芩

（附朮散）（五十八）傷寒手足逆冷筋脈拘急汗出不止項強直搖頭口噤

附子一兩炮　白朮一兩　川芎三錢　獨活半兩　桂心二錢

右擣羅爲末每服三錢水一中盞棗子二枚同煎至五分溫服

（桂心白朮湯）（五十九）治傷寒陰痙手足厥冷筋脈拘急汗出不止者

白朮　桂心　附子炮去皮臍　防風去蘆頭　芎藭　甘草炙微赤各一兩五錢

右剉如麻豆大以水二盞藥五錢生姜四片棗三枚同煎至八分去滓溫服

（附子防風散）（六十）治傷寒陰痙閉目合面手足厥逆筋脈拘急汗出不止者。

白朮一兩。　白茯苓三分。　柴胡一兩半去苗。　五味子一兩。　乾姜三分炮裂切。

甘草三分炙微赤切。　附子三分炮裂去皮臍。　桂心半兩。　防風三分去蘆頭。

右件藥擣篩粗散。每服三錢。以水一盞。入生姜四片。煎至六分去滓。不計時候溫服。

（八物白朮散）（六十一）治傷寒陰痙三日不差。手足厥冷。筋脈拘急。汗不出。恐陰氣內傷。

白朮半兩。　白茯苓半兩。　麻黃半兩去節炮三沸焙。　五味子半兩。　桂心三分。

高良姜一分。　羌活半兩。　附子三分炮裂去皮臍。

右件藥擣篩粗散。每服四錢。以水一大盞。入生姜四片。煎至五分去滓。不計時候溫服。

（柴胡半夏湯）（六十二）治痰熱頭疼。利膈除煩悶。手足煩熱。榮衞不調。肢節拘倦。身體疼痛。嗜臥少力。飲食無味。兼治五飲。消痰癖。

柴胡八兩。　人參三兩。　半夏二兩半洗。　甘草三兩炙。　黃芩三兩。

白朮二兩。　麥門冬三兩去心。

右剉如麻豆大。每服抄五錢匕。水一盞半。生姜五片。棗子一枚。煎至八分。去滓溫服。

（金沸草散）（六十三）治傷寒中脘有痰。令人壯熱。頭痛。項筋緊急。時發寒熱。皆類傷風。但不頭痛爲異耳。

前胡三兩．　荆芥四兩．　半夏一兩淨洗姜汁浸．　赤芍藥二兩．　細辛一兩．

甘草一兩炙．　旋復花三兩．

右件擣羅爲末．每服二錢．水一盞．生姜五片．棗子一枚．同煎至六分．去滓熱服．未知再服．

類證活人書卷第十八

（大半夏湯）（六十四）治痰飲及脾胃不和。

半夏不拘多少如法湯洗了薄切乾焙每遇膈間有寒痰用半夏白茯苓生姜各一分細切水二盞半煎至一盞濾去滓臨睡溫呷如有熱痰加炙甘草一分如脾胃不和去甘草入陳橘皮一分同煎。

（越婢湯）（六十五）治風痹脚弱。

石膏四兩　附子一兩炮去皮臍　白朮二兩　甘草一兩炙微赤　麻黃三兩去節湯泡焙乾

右件剉如麻豆大每服四錢以水一盞半生姜三片棗子一枚煎至八分去滓服。

（脾約丸）（六十六）治老人津液少大便澁及脚氣有風大便結燥者。

大黃二兩酒浸焙乾　厚朴刮去皮用姜汁炙　枳殼麩炒去穰　白芍藥已上各半兩　麻子仁一兩半微炒　杏仁去皮尖炙炒三分

右爲細末煉蜜和杵千下丸如梧桐子大每服二十丸溫水下不拘時候未知加五丸十丸止下利服糜粥將理。

（黑神丸）（六十七）治溫疫時氣有積食者。

巴豆新好者一兩輕搥去皮以急流水約二椀浸一宿然後更煮三五十沸後冷濾出去心膜以帛子拭去水然後研如膏用厚紙十數重裹以重物掉去油

五靈脂二分・黑色者爲上・　杏仁半兩・燒過後研・入藥再研・　大戟半兩・生用去皮・裏面如粉白者爲妙・　荆三稜半兩生用・

豆豉二兩須要新軟者爲妙・不得令晒乾・與巴豆等同研勻細・

右三味爲極細末方始入巴豆豉研勻後入杏仁更研令勻細別入飛羅麵半匙以井花水調如糊漸次拌藥搜和得所入臼中搗三二千下丸如菉豆大晒乾入甆合內頻晒或微火焙亦得如遇傷寒有食積者脈沉結身體不熱即下之量患人臟腑虛實加減丸數服用煎姜棗湯吞下取微利爲度不可太過溏泄身熱下之則爲痞氣結胸若病在上可吐者同生姜乾嚼三五丸

(神功丸)(六十八)治三焦氣壅心腹痞悶六腑風熱大便不通津液內枯大腸乾澁裏急後重或下鮮血痰唾稠粘風氣下流腰疼脚重臍下脹痛溺赤如金

大黃三兩・　人參半兩・　麻子仁五兩另研・　訶子皮炮取二兩・

右杵研爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服二十丸溫水下日三服以通爲度產後大便祕者每服十丸米飲下

(五柔丸)(六十九)治老人虛人脚氣亡津液虛祕大便結調補三焦

大黃四兩・　前胡一兩・　半夏洗七次・　蓯蓉酒浸・　芍藥　茯苓去皮・

細辛　當歸　葶藶炒・各半兩・

右擣羅爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大溫水下二十丸以通利爲度

（大三脘散）（七十）治三焦氣逆。胸膈虛痞。兩脇氣痛。面手浮腫。大便祕澁。兼治脚氣。

獨活一兩。　白朮三分。　甘草三分微炙。　乾木瓜切焙乾秤一兩。　紫蘇一兩。

大腹皮一兩炙黃用。　陳橘皮三分。　沉香一兩。　木香三分。　川芎三分。

檳榔三分。

右十一味。同一處。杵爲粗散。每劑秤一兩。水二盞。同煎至一盞。去滓。分二服。帶温服。取便利爲効。如能臨晚常進半劑。依法煎服。卽腹臟調和。風氣人多祕滯。數宜服之。未通利者。依法煎服。此藥極不虛人氣。經驗多矣。脚氣心腹氣悶。大便祕滯者良。

（檳榔散）（七十一）治脚腫。

橘葉一大握。　沙木一握。　小便小盞。　酒半盞。同已上藥煎。

右煎數沸。調檳榔末二錢。食後服。

（薏苡仁酒法）（七十二）治脚痹。

薏苡仁　牛膝各二兩。　海桐皮　五加皮　獨活　防風

杜仲姜汁炙。已上各一兩。　白朮半兩。　枳殼一兩炒。　生乾地黃二兩半。

右剉爲麄末。以生絹袋內。無灰酒五升浸。春夏秋冬二七日。夏月盛熱。分作數劑。逐旋浸酒。每日空心温服一盞。或半盞。日三四服。常令酒氣醺醺不絕。久服覺皮膚下如數百條蟲行。卽風濕氣也。

（木瓜散）（七十三）治脚氣。

大腹皮一枚。　紫蘇一分。　乾木瓜一分。　甘草一分炙。　木香一分。

羌活一分。

右細剉爲散。分作三服。每服用白水一盞。煎至半盞。去滓通口服。

（葱豉湯）（七十四）治傷寒一二日。頭項腰背痛。惡寒脈緊無汗者。此湯主之。

豆豉二大合。　葱白十五莖。　麻黃四分去節。　乾葛八分。

右件以水二升。先煎麻黃六七沸。掠去白沫。乾葛煎二十餘沸。下豉煎取八大合。去滓分二次温服。如人行五六里。服訖良久。煮葱豉湯熱喫。卽取汗。

（連鬚葱白湯）（七十五）治傷寒已發汗。或未汗。頭疼如破。

生姜二兩。　連鬚葱白寸切半升。

右以水二升。煮一升去滓。分作二三服。服此湯不差者。服葛根葱白湯。

（葛根葱白湯）（七十六）治頭疼不止。

葛根　芍藥　知母各半兩。　葱白一把。　川芎一兩。　生姜一兩。

右剉如麻豆大。水三升煎一升半去滓。每服一湯盞。

（雄鼠屎湯）（七十七）治勞復。

梔子十四枚劈。　枳殼三枚炒。　雄鼠屎二七枚。兩頭尖。即

右爲粗末。每服四錢。水一盞半。入葱白二寸。香豉三十粒。同煎一盞。分作二服。勿令病人知鼠屎。

（黃芩芍藥湯）（七十八）治鼻衄。

黃芩三分。　芍藥　甘草炙。各半兩。

右爲粗末。每服三錢。水一盞。煎至六分。去滓溫服。

（酒蒸黃連丸）（七十九）治暑毒伏深。累取不差。無藥可治。伏暑發渴者。此方尤妙。

黃連四兩。以無灰好酒浸面上約一寸。以重湯熬乾。

右搗羅爲細末。糊爲丸如梧桐子大。滾水下三五十丸。胸膈涼。不渴爲驗。

（茅花湯）（八十）治鼻衄不止。

茅花一大把。水三盞。煎濃汁一盞。分作二服。即差。如無花以根代之。

（枳實理中丸）（八十一）治傷寒結胸欲絕。心膈高起。手不得近者。宜此治之。

茯苓二兩。　人參二兩。　枳實十六片麩炒。　白朮二兩。　乾姜二兩炮。　甘草二兩炒。

右搗羅爲細末。煉蜜爲丸。如雞子黃大。每服一丸。熱湯化下。連進二三服。胸中豁然。渴者加栝樓根二兩。下利者加牡蠣二兩。煅之。

（小半夏加茯苓湯）（八十二）治諸嘔噦。心下堅痞。膈間有水痰。眩悸者。

半夏五兩湯浸洗七遍　白茯苓三兩去皮

右剉如麻豆大每服半兩水三盞煎至一盞秤生姜四錢取自然汁投藥中更煎兩沸熱服不拘時

（桔梗枳殼湯）（八十三）治傷寒痞氣胸滿欲絕

桔梗　枳殼麩炒去穰各一兩

右剉如麻豆大以水二盞煎至一盞去滓分二服

（赤茯苓湯）（八十四）治傷寒嘔噦心下滿胸膈間宿有停水頭眩心悸

赤茯苓一兩　芎藭半兩　半夏半兩湯洗七遍去滑　人參一兩去蘆頭　白朮半兩　陳橘皮一兩湯浸去白穰焙

右件藥擣羅爲粗末每服四錢水一盞半生姜五片煎至七分去渣溫服不拘時候

（香薷散）（八十五）治陰陽不順清濁相干氣射中焦名爲霍亂此皆由飽食腥膾復啖乳酪海陸百品無所不餐多飲寒漿眠臥冷席風冷之氣傷於脾胃諸食結而不消陰陽二氣壅而不反陽氣欲降陰氣欲升陰陽交錯變成吐利不已百脈昏亂榮衞俱虛令搏於筋令轉筋宜服此方

厚朴去皮二兩　香薷穗一兩半　黃連二兩二味入生姜四兩同杵炒令紫色用

一方有白扁豆尤良

右擣爲粗末每服三錢水一盞酒半盞同煎至七分去滓用新汲水頻頻浸換令極冷頓服之藥冷則効速也仍煎服時不得犯鐵器慢火煎之兼治非時吐利霍亂腹中撮痛大渴煩躁四肢逆冷冷汗自出兩脚轉筋疼痛不可忍者須井中沉令極冷頓服之乃有神効

（犀角地黃湯）（八十六）治傷寒及溫病。應發汗而不發汗。內有瘀血。鼻衄吐血。面黃大便黑。此方主消化瘀血。兼治瘡疹出得太盛。以此解之。

芍藥三分。　生地黃半斤。　牡丹皮去心一兩。　犀角一兩屑。如無。以升麻代之。（升麻犀角。性屬兩途。）

右剉如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。煎取一盞。有熱如狂者。加黃芩二兩。其人脈大來遲。腹不滿。自言滿者爲無熱。更不用黃芩也。

（黃連解毒湯）（八十七）治時疾三日已汗解。或因飲酒復劇。苦煩悶。乾嘔口燥。呻吟錯語。不得臥。

黃連三分。　黃蘗半兩。　黃芩一兩。　梔子四枚劈。

右剉如麻豆大。每服五錢。水一盞半。煎取一湯盞。去滓服。未知再服。進粥以此漸差。外臺云。凡大熱盛煩嘔。呻吟錯語不得眠。皆傳此方。諸人用之亦効。此直解熱毒。除酷熱。不必飲酒劇者。

（酸棗湯）（八十八）治傷寒吐下後。心煩乏氣。晝夜不眠。

酸棗仁四升。　甘草一兩炙。　知母二兩。　茯苓三兩去皮。　川芎三兩。　乾姜三兩。　麥門冬一升去心。

右爲粗末。每服四錢。水一盞。煎至七分。去滓溫服。

（梔子烏梅湯）（八十九）治傷寒後。虛煩不得眠。心中懊憹。

梔子半兩。　黃芩半兩。　甘草半兩炙微赤。　柴胡一兩。　烏梅肉十四枚微炒用。

右爲粗末。每服四錢。水一盞半。生姜三片。竹葉十四片。豉五十粒。煎至七分。去滓溫服。

（橘皮乾姜湯）（九十）治噦。

橘皮　通草　乾姜炮。　桂心各二兩。　人參一兩。　甘草炙二兩。

右剉如麻豆大。每服四錢。水一盞煎至六分。去滓溫服。日進三服。

（羌活附子散）（九十一）治欬逆。

羌活　附子炮。　茴香微炒各半兩。　木香　乾姜炮各大棗許大。

右爲細末。每服二錢。水一盞鹽一捻。同煎一二十沸。帶熱服。一服卽止。

（半夏生姜湯）（九十二）治噦欲死。

生姜二兩切。　半夏洗一兩一分。

右以水二盞。煎至八分去柤。分二服。

（黑膏）（九十三）療溫毒發斑。

好豉一升。　生地黃半斤切。

右二味以猪膏二觔。合露之。煎令三分減一。絞去滓。用雄黃射香如大豆者。內中攪和。盡服之。毒便從皮中出則愈。忌蕪荑。

（葛根橘皮湯）（九十四）療冬溫未卽病。至春被積寒所折不得發。至夏得熱。其寒解。冬溫始發。肌中斑爛癮疹如錦紋而欬。心悶。但嘔吐青汁。服此湯卽靜。

葛根　橘皮　杏仁去皮尖研炒　知母　黃芩　麻黃去節湯泡　甘草炙各半兩

右剉如麻豆大每服五錢以水一大盞半煎至一中盞去滓溫服

（玄參升麻湯）（九十五）治傷寒發汗吐下後毒氣不散表虛裏實熱發於外故身斑如錦紋甚則煩躁譫語兼治喉閉腫痛

玄參　升麻　甘草炙各半兩

右剉如麻豆大每服抄五錢匕以水一盞半煎至七分去滓服

（大青四物湯）（九十六）治傷寒熱病十日已上發汗及吐利後熱不除身上斑出者

大青四兩　豆豉八合　阿膠一兩炙　甘草一兩炙

右剉如麻豆大每服抄五錢匕以水一盞半煎至一盞旋入膠再煎令烊

（知母桂心湯）（九十七）治傷寒後不差朝夕有熱如瘧狀

知母一兩　麻黃一兩去節　甘草一兩炙　芍藥一兩　黃芩一兩　桂心一兩

右剉如麻豆大每服四錢水一盞半生姜四片煎一盞去滓取八分清汁溫熱服日三溫覆令微汗若心煩不眠其人欲飲水當稍與之令胃中和則愈

（三黃丸）（九十八）治吐血黃疸

黃連三兩　大黃一兩　黃芩二兩

右搗羅爲細末。煉蜜爲丸如梧桐子大。每服十五丸。漿白湯送下。

（桔梗半夏湯）（九十九）治傷寒冷熱不和。心腹痞滿。時發疼痛。順陰陽。消痞滿。

桔梗細切。一兩微炒　半夏一兩姜汁製。　枳實半兩麩炒赤用。　陳橘皮湯浸去穰焙乾已上各一兩。

爲末。每服四錢。水一鍾。姜三片。煎七分去滓。熱服。

（三黃熟艾湯）（一百）治傷寒四五日而大下。熱利時作。白通湯諸藥多不得止。宜服此湯除熱止利。

黃芩　黃連　黃蘗三分。　熟艾半雞子大。

右剉如麻豆大。以水二大盞。煎至七分。去滓溫服。

（薤白湯）（一百一）傷寒下利如爛肉汁。赤滯下。伏氣腹痛。諸熱毒。悉皆治之。

豉半斤綿裹。　薤白一把。　梔子七枚。大者破之。

右剉如麻豆大。以水二升半。先煎梔子十沸。下薤白。煎至二升許。下豉。煎取一升二合。去滓。每服一湯盞。

（赤石脂丸）（一百二）傷寒熱利。

黃連　當歸各二兩。　赤石脂　乾姜炮。各一兩。

右搗羅爲末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服三十丸。米飲呑下。日三服進之。

（地榆散）（一百三）治傷寒熱毒不解。日晚卽壯熱。腹痛便痢膿血。並宜治之。

地榆一兩切。 犀角屑一兩。 黃連一兩去鬚微炒。 茜根一兩。 黃芩一兩。 梔子仁半兩。

右件藥擣爲粗末每服四錢以水一盞入薤白五寸煎至六分去滓不計時候温服。

（黃連阿膠湯）（一百四）治傷寒熱毒入胃下利膿血。

梔子仁半兩。 黃蘗一兩微炙切。 黃連二兩去鬚微炒。 阿膠一兩切碎炒令黃。

右件藥擣爲粗末每服四錢用水一盞煎至七分去滓不拘時候温服。

（桃仁湯）（一百五）治蠱女力切。蟲食病。

槐子一兩碎。 艾葉一兩。 大棗十五枚去核。 桃仁一兩去皮尖雙仁炒。

右以水二大盞半煎至一盞半分三服。

（黃連犀角湯）（一百六）治傷寒及諸病之後內有瘡出下部者。

黃連半兩。 烏梅七個。 木香一分。 犀角一兩。如無以升麻代用之。

右以水二大盞半煎至一盞半分。

（雄黃銳散）（一百七）治下部䘌瘡。

雄黃研。 青葙子 苦參 黃連 桃仁去皮尖研一分。

右爲散以生艾擣汁和如棗子核大綿裹內下部扁竹汁更佳冬間無艾只用散綿裹內下部亦得。

（百合知母湯）（一百八）治百合病發汗後者。

百合七枚　知母三兩切

右先以水洗百合漬一宿當白沫出去其水更以泉水二升煎取一升去滓別以泉水二升煎知母每取一升去滓後合和煎取一升五合分溫再服

（滑石代赭湯）（一百九）治百合病下之後者

百合七枚劈　滑石三分碎綿裹　代赭如彈丸大一枚綿裹

右先以水洗百合漬一宿當白沫出去其水更以泉水二升煎取一升去滓別以泉水二升煎滑石代赭取一升去滓後合和重煎取一升五合分溫服

（雞子湯）（一百十）治百合病吐之後

百合七枚劈　雞子黃十枚

右先以水洗百合漬一宿當白沫出去其水更以泉水二升煎一升去滓內雞子黃攪勻煎五分溫服

（百合洗方）（一百十一）治百合病一月不解變成渴者

右以百合一升以水一斗漬之一宿以洗身洗已食煮餅勿以鹽豉也

（百合地黃湯）（一百十二）治百合病不經吐下發汗病形如初

百合七枚劈　生地黃汁一升

右以水洗百合漬一宿當白沫出去其水更以泉水二升煎取一升去滓內地黃汁煎取一升五合分

溫再服。中病勿更服。大便當如漆。

（栝樓牡蠣散）（一百十三）治百合病渴不差。

栝樓根　牡蠣熬分等

右擣羅爲散。飲服方寸匕。日進三服。

（滑石散）（一百十四）治百合病變發寒熱。

百合一兩炙　滑石三兩

右杵羅爲散。飲服方寸匕。日進三服。當微利者。止勿服之。寒熱則除。

（治中湯）（一百十五）治脾胃傷冷。物胸膈不快。腹疼氣不和。

人參　乾姜炮　白朮　甘草炙　陳橘皮湯洗　青橘皮

右各等分爲細末。每服三錢。水一中盞。煎數沸。熱服。尋常入鹽點之。

（陽旦湯）（一百十六）治中風傷寒。脈浮發熱。往來汗出。惡風項強。鼻鳴乾嘔。

桂心　芍藥已上各三兩　甘草　黃芩各二兩

右剉如麻豆大。每服五錢。水一盞半。棗子一枚。生姜三片。煎至一盞。取八分清汁。溫服。自汗者去桂心。加附子一枚炮。渴者去桂心。加栝樓三兩。利者去芍藥、桂。加乾薑三兩。心下悸者。去芍藥加茯苓四兩。虛勞裏急者。正陽旦湯主之。煎時入膠飴爲佳。若脈浮緊無汗發熱者。不可與也。

（白虎加蒼朮湯）（一百十七）治溼温多汗。

知母六兩。　甘草炙二兩。　石膏一斤。　蒼朮三兩。　粳米三兩。

右剉如麻豆大。每服五錢。水一盞半。煎至八九分。去滓取六分清汁。温服。

（七味葱白湯）（一百十八）許仁則治傷寒或因起動勞復或因喫食稍多皆成此候。若復甚者。一女寒初有此症。宜服此湯。

乾葛切三合。　新豉半合綿裹。　葱白連鬚者切半升。　生姜切一合。　麥門冬去心。　乾地黄三兩。

勞水四升以杓洋之一千過。名曰勞水。

右七味用勞水煎之三分。減去滓。分二服。漸漸服取汗。

（增損四順湯）（一百十九）治少陰下利。手足冷無熱候者。

甘草炙二兩。　人參二兩。　龍骨二兩。　黄連　乾姜炙一兩。　附子一枚炮去皮臍。

爲細末。每服三錢。水一盞。煎七分。日三服。不差復作甚良。若下利腹痛加當歸二兩。嘔者加橘皮一兩。

（化斑湯）（一百二十）

人參半兩。　石膏半兩。　萎蕤　知母　甘草各一分。

右剉如麻豆大。每服抄五錢匕。水一盞半。入糯米一合。煎至八分。取米熟爲度。去滓温服。

（官局桔梗湯）（一百二十一）治乾嘔。

桔梗　半夏　陳橘皮各一兩　枳實半兩

爲粗末每服三錢水一盞生姜五片煎七分服之

（麻黃加朮湯）（一百二十二）治中溼

麻黃一兩半去節湯泡　甘草半兩炙　桂枝一兩去皮　蒼朮半兩　杏仁三十五枚去皮尖

右剉麻豆大每服五錢水一盞半煎八分溫服

（竹皮大丸）（一百二十三）治虛煩

生竹茹二分　石膏三分　桂心一分　甘草三分炙　白薇一分

右爲細末棗肉丸彈子大米飲服一丸日三夜一有熱者倍白薇煩喘者加枳實一分

（古今錄驗橘皮湯）（一百二十四）療春冬傷寒秋夏冷溼欬嗽喉中鳴聲上氣不得下頭痛方

陳橘皮　紫菀　麻黃去節湯泡　杏仁去皮尖　當歸　桂心

甘草炙　黃芩各半兩

右剉如麻豆大每服抄五錢匕用水一盞半煎至一盞去滓服

（黃連橘皮湯）（一百二十五）治溫毒發斑

黃連四兩去毛　陳橘皮去白　杏仁去皮尖　枳實炙　麻黃去節湯泡

葛根各二兩　厚朴姜汁製　甘草各一兩炙

右剉如麻豆大。每服抄五錢匕。用水一小盞半。煎至一盞。去滓服。下利當先止。

（麥門冬湯）（一百二十六）治勞氣欲絕。

麥門冬一兩去心。　甘草炙二兩。

右剉如麻豆大。先用水二小盞。入粳米半合。煎令米熟去米。約得水一小盞半。入藥五錢。棗二枚。竹葉十五片。同煎至一盞。去滓溫服。不能服者。綿漬口中。

類證活人書卷第十九

此一卷論婦人傷寒。古人治病。先論其所主。男子調其氣。婦人調其血。血室不畜。則二氣和諧。血室凝結。水火相刑。傷寒氣口緊盛卽宜下。人迎緊盛卽宜汗。婦人左關浮緊不可下。當發其汗。以救其血室。榮衞得和。津液自通。浹然汗出而解。仲景云。婦人傷寒。經水適斷。晝日明了。暮則譫語。如見鬼狀。此爲熱入血室。無犯胃氣。及上二焦。無犯胃氣者。言不可下也。小柴胡湯主之。若行湯遲。則熱入胃。令津燥中焦。上焦不榮。成血結胸狀。須當針期門也。五行相尅以生。相扶以出。平居之日。水常養於木。水木相生。則榮養血室。血室不畜。脾無蘊積。脾無蘊積。則剛燥不生。剛燥既生。若犯胃氣。則晝夜譫語。喜忘。小腹滿。小便利。屬抵當湯證也。傷寒胃實譫語。宜下之。婦人熱入血室譫語者。不可下耳。雖然。婦人傷寒。與男子治法不同。男子先調氣。婦人先調血。此大略之詞耳。要之。脈緊無汗名傷寒。脈緩有汗爲傷風。熱病脈洪大。中暑脈細弱。其證一也。假如中暍用白虎。胃實用承氣。豈必調血而後行湯耶。仲景傷寒論所以不分婦人。良亦以此。學者皆可隨病於男子藥證中以意選用也。若妊婦傷寒。藥性須涼。愼不可行桂枝半夏桃仁等藥。小柴胡去半夏名黃龍湯。蓋爲妊婦而去也。大抵產前先安胎。產後先補益。次服傷寒藥。若病稍退則止藥。不可盡劑。此爲大法。黃帝問婦人重身。毒之何如。岐伯曰。有故無殞。亦無殞也。大積大聚。其可犯也。衰其太半而止。過者死。

〔婦人傷寒藥方〕

男子婦人傷寒。仲景治法別無異議。比見民間有婦人傷寒方書。稱仲景所撰。而王叔和爲之序。以法

考之。間有可取。疑非古方也。特假聖人之名以信其說於天下。今取金匱玉函治婦人傷寒與俗方中可採者。列爲一卷。雖不足以盡婦人傷寒之詳。並可於百問中參用也。

婦人傷寒發熱。經水適來。晝日明了。暮則譫語。如見鬼狀者。此爲熱入血室。無犯胃氣。及上二焦。宜小柴胡湯。方見第十卷中。

婦人傷風七八日。續得寒熱。發作有時。經水適斷。此爲熱入血室。其血必結。故使如瘧狀。宜以小柴胡湯服之。方見第十卷中。

婦人傷寒。發熱惡寒。經水適來。得七八日熱除。脈遲身涼和。胸脇下滿如結胸狀譫語者。此爲熱入血室也。當刺期門。隨其實而取之。期門穴見第二卷中。

婦人傷寒六七日。胃中有燥屎。大便難。煩躁譫語。目赤。毒氣閉塞不得流通。宜瀉心三黃湯。

蜀大黃　鼠尾黃芩　雞爪黃連各等分。

右擣爲粗末。每服四錢。水一盞。煎八分。去滓服。取微利。如目赤睛疼。加白茯苓、嫩竹葉。瀉肝餘之氣。

婦人傷寒發熱惡寒四支拘急。口燥舌乾。經脈凝滯。不得往來。宜桂枝紅花湯。

桂心　芍藥　甘草炙。各三兩。　紅花一兩。

右剉如麻豆大。每服抄五錢匕。以水一盞半。生姜四片。棗二枚。煎至七分。去渣服。良久再服。汗出而解。

（黃芩芍藥湯）治婦人傷寒。口燥咽乾。腹滿不思飲食。

黃芩　白芍藥　白朮　乾地黃各一兩

右剉如麻豆大。每服抄五錢匕。以水一盞。煎至七分。去滓温服。寒則加生姜同煎服。

(柴胡當歸湯)婦人傷寒喘急煩躁。或戰而作寒。陰陽俱虛不可下。

柴胡三兩　白朮二兩　人參　甘草炙　當歸

赤芍藥各一兩　五味子　木通各半兩

右剉如麻豆大。每服抄五錢匕。以水一盞半。生姜四片。棗子二枚。煎至七分。去滓温服。

(乾地黃湯)婦人傷寒差後。猶有餘熱不去。謂之遺熱。

乾地黃　大黃　黃連　黃芩各一兩　柴胡去蘆

白芍藥　甘草各一兩半炙

右擣爲粗末。每服抄四錢匕。以水一盞半。煎至七分。去滓温服。取溏利汗出解。

(燒裩散)婦人傷寒未平復。因交合。裹急腰胯連腹內痛。名曰陰陽易。

男子裩襠燒灰

右一味。以水和服方寸匕。男子用婦人裩燒灰。小便利。陰頭腫卽愈。

(青竹茹湯)婦人病未平復。因有所動。致熱氣上衝胸。手足拘急搐搦。如中風狀。

栝樓根無黃根者二兩　青竹茹刮半升淡竹者

右以水二升半煎取一升一合去滓分作二三次服。

（當歸白朮湯）婦人未平復因有所動小腹急痛腰胯疼四肢不任舉動無力熱發者。

白朮一分　當歸一分　桂枝一分去皮　附子一分生去皮皮破八片　生姜半兩
甘草一分炙　芍藥一分　人參一分　黃耆一分

右剉如麻豆大以水三升煎取一升半去滓通口服一湯盞食頃再服溫覆微汗差。

〔妊婦傷寒藥方〕

妊婦傷寒仲景無治法用藥宜有避忌不可與尋常婦人一概治之也。

（加減四物湯）妊婦產前腹痛及治月事或多或少或前或後胎氣不安產後血塊不散或亡血過多或惡露不下宜此服之。

當歸切焙　川芎　熟乾地黃　白芍藥各一兩

右擣爲粗末每服四錢水一盞半煎至八分取六分清汁帶熱服日二三以知爲度若妊孕下血卽入艾五七葉阿膠末一錢匕同煎服如前法疾勢甚大散藥不支以四味各半兩細剉以水四盞煎至二盞半去滓分四服熱喫食前服一日之中令盡以和爲度平常產乳服至三臘止如虛弱血臟不調至一月止因虛致熱熱與血搏口舌乾渴欲飲水加栝樓一兩麥門冬三分腹中刺痛惡物不下加當歸芍藥各一分血崩加地黃蒲黃各一兩因熱生風加川芎一分柴胡半兩身熱脈躁頭昏項強加柴胡

黃芩各半兩。祕澁。加大黃半兩。桃仁一分。炒。滑瀉。加桂附各一分。發寒熱。加乾姜牡丹皮芍藥各一分。嘔。加白朮人參各半兩。腹脹。加厚朴枳實各一分。虛煩不得眠。加竹葉人參各一分。躁大渴。加知母石膏各半兩。水停心下。微此逆。加猪苓茯苓防己各一分。虛寒狀類傷寒。加人參柴胡防風各三分。

(阿膠散)妊婦傷寒安胎。

阿膠炒。　桑寄生　吳白朮　人參　白茯苓各等分。

右爲細末。煎糯米飲調下二錢匕。日進二服愈。

(白朮散)妊婦傷寒安胎。

白朮　黃芩各等分。新瓦上並同炒香。

右擣羅爲末。每服三錢匕。水一中盞。生姜三片。大棗一枚。拍破同煎至七分。溫服。但覺頭疼發熱。便可服。三二服卽差。唯四支厥冷。陰證見者。未可服。

(葱白湯)妊婦傷寒。憎寒發熱。當發其汗。

葱白十莖。　生薑二兩切。

右剉如麻豆大。以水二盞。煎至一盞。連服取汗。

(蘇木湯)妊婦傷寒。或中時行。洒淅作寒。振慄而悸。或加嘔者。

赤芍藥　陳橘皮　黃芩　宣黃連　甘草炙。　蘇木各一兩。

右爲粗末。每服抄五錢匕。以水一盞半。煎至八分。去滓温服。汗出差。若胎不安。兼服阿膠散。

(黃龍湯)姙婦寒熱頭疼。嘿嘿不欲飲食。脇下痛。嘔逆。痰氣。及產後傷風熱入胞宮。寒熱如瘧。幷經水適來適斷。病後勞復。餘熱不解。

柴胡一兩　黃芩　人參　甘草炙各一分半

右剉如麻豆大。每服五錢。水一盞半。煎一盞。去滓温服。

(柴胡石膏湯)姙婦傷暑。頭痛惡寒。身熱躁悶。四支疼痛。背項拘急。脣口乾燥。

柴胡四兩　甘草二兩　石膏八兩

右爲粗末。每服三錢。水一盞。生姜五片。煎至六分。去滓温服。不拘時。若氣虛體冷者。加人參四兩。

(枳實散)姙婦傷寒。四日至六日已來。加心腹脹。上氣。渴不止。食飲不多。腰疼體重者。

枳實一兩炒微黃　麥門冬半兩去心　陳橘皮三分湯浸去白穰焙

右粗末。每服三錢。以水一中盞。入生姜半分。葱白七寸。煎至六分。去滓温服。

(旋覆花湯)姙婦傷寒。頭目旋疼。壯熱心躁。

旋覆花半兩　白朮三分　前胡一兩去蘆　黃芩三分　人參三分去蘆

麻黃三分去根節用　赤芍藥半兩　石膏一兩　甘草半兩炙微赤

右擣爲粗末。每服四錢。用水一盞半。入生姜半分。煎至六分。去粗服。

(麥門冬湯)姙婦傷寒壯熱。嘔逆頭疼。不思飲食。胎氣不安者。宜此主之。

人參一兩。　石膏一兩。　前胡三分。　黃芩三分。　葛根半兩。　麥門冬半兩去心。

右剉如麻豆大。每服五錢。水一盞半。入生姜四片。棗子二枚。淡竹茹一分。煎至八分。去滓温服。

(梔子大青湯)姙婦發斑。變爲黑色。

升麻　梔子仁各二兩。　大青　杏仁去皮尖。　黃芩各一兩半。

右剉如麻豆大。每服五錢匕。以水一盞半。細切葱白三寸。煎至一盞。去滓温服。

(蘆根湯)千金姙娠頭痛壯熱。心煩嘔吐不下食。

知母四兩。　青竹茹三兩。

右剉如麻豆大。每服五錢。水一小盞半。入生蘆根一握。粳米一撮。煎至一盞。去柤服盡。更作差止。

(塗臍法)治姙娠遭時疾。令子不落。

取竈中黃土水和塗。乾復塗之。一方酒和塗方五寸。又泔淸和塗之並佳。

(葱白豉湯)治姙娠熱病。

葱白二兩半。　豉半升。

右以水三升。煎取一升。分二服取汗。

(葱白一物湯)

葱白一把。水一升。煮令熟服之取汗。食令盡。亦主安胎。若胎已死者。須臾卽胎出也。

（伏龍肝散）

用伏龍肝雞子許水調服之。伏龍肝卽竈下黃土是也。

（葛根一物飲）治熱煩悶。

葛根汁。每服一小盞。如人行五里進一服。無生葛。用乾葛㕮咀煎濃汁服。

（梔子五物湯）廣濟療妊娠傷寒頭痛壯熱。

梔子　前胡　知母各二兩。　黃芩一兩。　白石膏四兩。

右剉如麻豆大。每服抄五錢匕。用水一小盞半。煎至一盞。去滓服。

（前胡七物湯）治妊娠傷寒頭痛。支節痛壯熱。

前胡　知母　梔子仁各二兩。　石膏四兩。　大青　黃芩各一兩半。

右剉如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。入葱白三莖。煎至一盞。去滓溫服。

（升麻六物湯）急救療妊娠七月傷寒。壯熱。赤斑變黑。溺血。

升麻　梔子仁各二兩。　大青　杏仁去皮尖。　黃芩各一兩半。

右剉如麻豆大。每服五錢。水一盞半。入葱白三莖。煎至一盞。去滓溫服。

〔產後藥方〕

（陽旦湯）治婦人產後傷風。十數日不解。頭微痛。惡寒。時時有熱。心下堅。乾嘔汗出。宜用陽旦湯。方見第十卷中。

療婦人產後血虛多汗。喜中風。身體強直。口噤背反強。作痙治之。法見第六卷第五十問中。

（又方）用荊芥末三錢。溫酒調下。不瘥再服。

治婦人產後亡津液。大便多祕。或譫言煩躁。不可用湯液。宜神功丸用青木湯吞下。

（桂心牡蠣湯）婦人產後頭疼。身體發熱。兼治腹內拘急疼痛。

桂心三兩。　牡蠣煅。　白芍藥　乾地黃各五兩。　黃芩二兩。

右剉如麻豆大。每服抄五錢匕。以水一盞半。煎至一盞。去滓溫服。

（蜀漆湯）治婦人產後寒熱往來。心胸煩滿。骨節疼痛。及頭疼壯熱。日晡加甚。又如瘧狀。

蜀漆葉一兩。　黃芪五兩。　桂心　甘草炙。　黃芩各一兩。　知母　芍藥各二兩。

生地黃一斤。

右剉如麻豆大。每服抄五錢匕。用水一盞半。煎至一盞。去滓溫服。

（增損柴胡湯）婦人產後虛羸。發寒熱。飲食少。腹脹等疾。

柴胡三錢。　人參　甘草炙。　半夏湯泡。　白芍藥　陳橘皮　川芎各三分。

右剉如麻豆大。每服抄五錢匕。以水一大盞。生姜三片。棗子一枚。煎至七分。去滓。食後溫服。日三服。

（竹葉防風湯）婦人產後。傷風發熱。面赤喘而頭疼者。

竹葉半把　葛根一兩半　防風　桔梗　桂枝去皮　人參　甘草炙半兩各

右爲粗末每服四錢水一盞半生姜三片棗子一枚煎至八分去滓温服使汗出頸項強用附子炮去皮臍剉如豆大抄一大錢同煎嘔加半夏一錢

(三物黃芩湯)治婦人草蓐中傷風四支苦煩熱頭疼與小柴胡湯頭不疼但煩宜用此服之

黃芩半兩　苦參一兩　乾地黃二兩

右剉如麻豆大每服四錢水一盞半煎八分服之

治婦人產後亡血汗多故令鬱冒其脈微弱不能食大便反堅但頭汗出所以然者血虛而厥厥而必冒冒家欲解必大汗出以血虛下厥孤陽上出故但頭汗出所以產婦喜汗出者亡陰血虛陽氣獨盛故當汗出陰陽乃復所以便敗者嘔不能食也宜小柴胡湯主之

(乾薑柴胡湯)治婦人傷寒經脈方來初斷寒熱如瘧狂言見鬼者

柴胡四兩去蘆　栝樓根二兩　桂枝一兩半　牡蠣一兩熬　乾姜一兩炮　甘草炙一兩

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至七分去滓温服初服微煩再服汗出而愈

(海蛤散)治婦人傷寒血結胸膈揉而痛不可撫近婦人血結胸法當刺期門仲景無藥方治法此方疑非仲景然其言須有理姑存焉

海蛤　滑石　甘草各一兩炙　芒硝半兩

右擣羅爲散每服二錢雞子清調下小腸通利則胸膈血散膻中血聚則小腸壅小腸既壅膻中血不流行宜此方小便利血數行宜桂枝紅花湯發其汗則愈

類證活人書卷第二十

此一卷論小兒傷寒。小兒大人。治法一般。但小分劑。藥性差涼耳。尋常風壅發熱。鼻涕痰嗽煩渴。惺惺散主之。咽喉不利。痰實咳嗽。鼠粘子湯主之。頭額身體溫熱。大便黃赤。腹中有熱。四順散連翹飲三黃丸主之。頭額身體溫熱。大便白而酸臭者。胃中有食積。雙丸主之。小兒無異疾。唯飲食過度。不能自節。心腹脹滿。身熱頭痛。此雙丸悉治之。小兒身體潮熱。頭目碎痛。心神煩躁。小便赤。大便祕。此熱劇也。洗心散調胃承氣湯主之。頭疼發熱而偎人惡寒者。此傷寒證也。升麻湯主之。無汗者麻黃黃芩湯。有汗者升麻黃芩湯。皆要藥也。小兒尋常不可過當服涼藥。胃冷蟲動。其證與驚相類。醫人不能辨。往往復進驚藥。如腦射之類。遂發吐胃虛而成慢驚者多矣。小兒須有熱證。方可踈轉。仍慎用丸子藥利之。當以大黃川芎等㕮咀作湯液。以蕩滌蘊熱。蓋丸子巴豆乃攻食積耳。

(洗心散)治遍身壯熱。頭目碎痛。背膊拘急。大熱衝上。口苦脣焦。夜臥舌乾。咽喉腫痛。涕唾稠粘。痰壅。喫食不進。心神躁熱。眼澁睛疼。傷寒鼻塞。四支沉重。語聲不出。百骨節痛。大小便不利。麩豆瘡時行溫疫。狂語多渴。及小兒天弔風。夜驚並宜服之。

當歸四兩炒。　芍藥四兩生用。　甘草四兩炙。　荊芥四兩。　白朮一兩炒。　麻黃四兩去節炒。　大黃四兩以米泔水浸一炊間漉出令乾慢炒取熱。

右擣羅爲細末。每服抄二錢。水一盞。入姜一片。薄荷二葉。同煎至八分。放温和滓服。了仰臥。仍去枕少時。如五臟壅實。煎四五錢匕。若要溏轉則熱服。

(惺惺散)治小兒風熱。及傷寒時氣。瘡痧發熱。

桔梗　細辛　人參　白朮　栝樓根　甘草炙。　白茯苓　川芎各等分。

右擣羅爲末。每服二錢。用水一盞。生姜二片。薄荷二葉。同煎七分服。三歲已下作四五服。五歲已上分二服。凡小兒發熱。不問傷風風熱。先與此散數服。往往輙愈。

(四順散)解大人小兒膈熱。退壅盛。涼心經。

大黃蒸。　甘草炙。　當歸洗。　芍藥

右各等分爲細末。每服二錢。以水一盞。薄荷二葉。煎至七分。温服。小兒量歲數與之。

(麻黃黃芩湯)小兒傷寒無汗。頭疼發熱惡寒。

麻黃去節一兩。　黃芩　赤芍藥各半兩。　甘草炙。　桂枝去皮各一分。

右擣羅爲細末。每服二錢。滚水調下。日三服。兼治天行熱氣。生豌豆瘡不快。益煩躁昏潰。或出尙身疼熱者。

(升麻黃芩湯)治小兒傷風有汗。頭疼發熱惡寒。

升麻　葛根　黃芩　芍藥各三錢。　甘草一錢半炙。

右剉如麻豆大。每服二錢。以水一中盞。煎至六分。去滓溫服。若時行瘡豆出不快。煩躁不眠者。加木香一錢五分。

（甘露飲子）治胃中客熱口臭。不思飲食。或饑煩不欲食。齒齦腫疼。膿血舌口。咽中有瘡。赤眼目瞼重不欲開。瘡疹已發未發。並宜服。

熟乾地黃　生乾地黃　天門冬　麥門冬並去心焙　枇杷葉去毛　枳殼麩炒去穰　黃芩　石斛去苗　山茵蔯　甘草炙各等分

右爲細末。每服二錢。水一盞。煎至六分。去滓溫服。食後臨臥。

（雙丸）治小兒身熱頭痛。飲食不消。腹脹滿。或心腹疼痛。大小便不利。或下重數起。未差。可再服。小兒蒸候。哺食減少。氣息不快。夜啼不眠。是腹內不調。並宜用此丸下之。

甘遂半兩　朱砂一錢另研　麥門冬二兩半去心　棗核去仁另研四兩半　牡蠣二兩煅　甘草一兩一分炙　巴豆六十枚去皮心膜研油。日中曬之。自如霜者

右麥門冬甘草甘遂牡蠣四味爲細末。入巴豆朱砂棗仁合和。搗二千杵。更入少蜜搗和。極熟旋丸。半歲兒服如荏子大一雙。一歲兒服如半麻子大分爲一雙服。如二歲麻子大一枚分一雙。三四歲者服如麻子大二丸。五六歲者服如大麻子大二丸。七八歲者如小豆大二丸。十歲微大於小豆二丸。常以雞鳴時服。如至日出時不下者。熱粥飲服數合投之。即下藥丸。皆雙出也。下利甚者。濃煎冷粥飲之便

止。

（石膏麻桂湯）治小兒傷寒未發熱。咳嗽。頭面赤。

麻黃一兩去節湯泡。　甘草半兩炙。　石膏半兩。　芍藥半兩。　桂心一分。　黃芩一兩。　杏仁十枚去皮尖。

右七味爲散。每服二錢。水一中盞。入生姜二片。煎半盞。去滓服。兒若甚小。以意增減之。

（連翹飲）治小兒一切熱。

連翹　防風　甘草　山梔子各等分。

右件擣羅爲末。每服二錢。水一中盞。煎七分。溫服。

（麥門冬湯）治少小未滿百日。傷寒鼻衄。身熱嘔逆。

麥門冬三分去心。　石膏　寒水石　甘草各半兩炙。　桂心三錢半。

右剉如麻豆大。每服三錢。水一盞。煎七分。溫服。

（十物升麻湯）治小兒傷寒變熱毒病。身熱面赤。口燥心腹堅急。大小便不利。或口瘡。或因壯熱。便四支攣掣。驚仍作。癎疾時發時醒。醒後身熱如火者。

升麻　白薇　麻黃去根節。　□□　柴胡　甘草各半兩炙。　黃芩一兩。　朴消　大黃　鈎藤各一分。

右剉如麻豆大。每服三錢。水一盞。煎至七分。去滓下硝。再煎化。溫服。

（六物黃芩湯）治少小腹大。短氣。熱有進退。食不安。穀爲之不化。

黃芩　大青　甘草炙。　麥門冬　石膏各半兩。　桂心三錢。

右剉如麻豆大。每服三錢。水一盞。煎七分。溫服。

(五物人參飲)治小兒天行壯熱。欬嗽心腹脹滿。

人參　甘草各半兩炙。　麥門冬一兩去心。　生地黃一兩半。如無只用生乾地半兩。

右剉如麻豆大。每服三錢。水一盞。入茅根半握。煎至七分。去滓。溫服。

治小兒八物麥門冬飲。

麥門冬三兩去心。　甘草炙。　人參各一分。　紫菀　升麻各二兩。　貝母一分半。

右剉如麻豆大。每服三錢。水一盞。入茅根半握。煎至七分。去滓。再入竹瀝少許。重煎服。

(棗葉飲)治小兒天行五日以後。熱不歇者。

棗葉半握。　麻黃半兩去根節。　豉一合。　葱白一切合。

右件共童子小便二盞。煎至一盞。去滓。分二服。

類證活人書卷第二十一

此一卷論小兒瘡疹。瘡疹與傷寒相類。頭疼身熱。足冷脈數。疑似之間。只與升麻湯。緣升麻湯解肌。兼治瘡子已發未發皆可服。但不可疎轉。此爲大戒。傷寒身熱。固不可下。瘡疹發熱在表。尤不可轉。世人不學。乃云初覺以藥利之。宣其毒也。誤矣。又云瘡豆已出不可疎轉。出得已定。或膿血大盛。卻用疎利。亦非也。大抵瘡疹首尾皆不可下。小兒身熱耳冷尻冷咳嗽。輒用利藥。即毒氣入裏殺人。但與化毒湯、紫草木通湯、鼠粘子湯。出得大盛。即用犀角地黃湯解之。若瘡豆出不快。煩躁不得眠者。水解散、麻黃黃芩湯、升麻黃芩湯、活血散主之。黑瘡倒厭。猪尾膏、無比散、龍腦膏子。無不驗也。若熱毒攻。咽喉痛。如聖湯。瘡豆入眼。決明散、撥雲散、蜜蒙花散、通聖散、蛤粉散主之。治瘡疹法。無出此矣。

(升麻湯)治傷寒中風頭痛。增寒壯熱。支體痛。發熱畏寒。鼻乾不得睡。兼治小兒大人瘡疹。已發未發。皆可服。兼治寒暄不時。人多疾疫。乍暖脫着。及暴熱之次。忽變陰寒。身體疼痛。頭重如石。本方四味見雜方第十六卷中。

(犀角地黃湯)治傷寒及溫病。應發汗而不發汗。內有瘀血者。及鼻衄吐血不盡。內有餘瘀血。面黃大便黑者。此方主消化瘀血。兼治瘡疹。出得太盛。以此方解之。本方四味。方在雜方第十八卷中。

(麻黃黃芩湯)治小兒天行熱氣。生豌豆瘡不快。益煩躁昏憒。或出尙身疼熱者。本方五味。在小兒方第二十卷中。

(升麻黃芩湯)治小兒時行瘡豆出不快。煩躁不眠。加木香一錢五分。本方五味。在小兒方第二十卷中。

(化毒湯)治小兒瘡豆已出未出並皆服之。

紫草嫩者。　升麻　甘草炙。各半兩。

右剉如麻豆大。以水二盞。糯米五十粒。煎至一盞。去滓温服。

(紫草木通湯)治小兒瘡疹。

紫草去蘆。　木通　人參　茯苓去皮。　糯米各等分。　甘草半之。

右剉如麻豆大。每服四錢。七。以水一盞半。煎至一盞。去滓温服。

(鼠粘子湯)治疹豆欲出未能得透皮膚。熱氣攻咽喉。眼赤心煩者。

鼠粘子四兩炒香。　甘草一兩炙。　防風半兩。　荆芥穗二兩。

右擣羅爲末。每服二錢。沸湯點服。食後臨臥。逐日三服。大利咽膈。化痰涎止嗽。若春冬間。常服免生瘡癤。老幼皆宜服。

(水解散)治天行頭痛、壯熱一二日。兼治疱瘡未出、煩躁。或出尙身體發熱。

大黃　黃芩　桂心　甘草炙。　芍藥各二兩。　麻黃四兩去節湯泡焙秤。

右擣羅爲末。患者以生熟湯浴訖。以煖水調下二錢。相次二服。得汗利便差。強實人服二方寸匕。此調風實之人。三伏中宜用。若去大黃。卽春夏通用。

(活血散)治瘡子或出不快。

用白芍藥末一錢。酒調。如欲止痛。用溫熟水調下。

(猪尾膏)治瘡子倒厭。

用小猪兒尾尖。刺血一兩點。入生腦子少許同研。新水調下。立効。

(無比散)治瘡疹惡候不快及黑瘡子。應一切惡候。

牛黃　麝香　龍腦　膩粉各一分研細。　朱砂一兩。先研如粉。

右爲極細。如有患者。小兒一字。大人半錢。水銀少許同小猪尾上血三兩滴。新汲水少許。同調服。先寧穩得睡。然後取轉下如爛魚腸、蒲桃穗之類。涎臭惡物便安。小兒用嫩汁滴尤妙。

(龍腦膏子)治時疾發豌豆瘡。及赤瘡子未透。心煩狂躁。氣喘妄語。或見鬼神。或已發而陷伏。皆宜速治。不爾。毒入臟必死。

生龍腦一錢。

右細研。旋滴猪心血和丸。雞頭肉大。每服一丸。心煩狂躁者。用紫草湯化下。若瘡子陷伏者。用溫酒化下。少時心神便定。得睡。瘡疹發透。依常將息也。

(如聖湯)治小兒瘡疹毒攻咽喉腫痛。

桔梗一兩。　牛蒡子炒一兩。　甘草生一兩。　麥門冬去心半兩。

右爲細末。每服二錢。沸湯點。細細呷服。入竹葉煎服尤妙。

（決明散）治瘀痘瘡入眼。

決明子一分。　瓜蔞根半分。　赤芍藥一分。　甘草一分炙。

右擣羅爲末。每服半錢。蜜水調下。日進三服。

（撥雲散）治瘀痘瘡入眼及生翳。

桑螵蛸眞者一兩炙令焦細研。

右擣羅爲細末。入麝香少許。令勻。每服二錢。生米泔調下。臨臥服之。

（蜜蒙花散）治瘀痘瘡。幷諸毒氣入眼。

蜜蒙花一錢半淨。　青葙子　決明子　車前子各半錢。

右爲細末。用羊肝一片。破開。作三片。摻藥令勻。卻合作一片。以溼紙七重裹。煻灰火中。煨熟。空心食。

（通聖散）治瘀痘瘡入眼及生翳。

白菊花一兩。如無。則甘菊花代之。然不如白菊。　蒺藜皮　穀精草去根。各一兩。

右擣羅爲末。每服用一大錢。乾柿一個。生粟米泔一盞。共一處。煎候米泔盡。只將乾柿去核喫之。不拘時候。一日可喫三枚。日淺者五七日可効。遠者半月餘矣。

（蛤粉散）治小兒瘡子入眼。

穀精草　蛤粉各等分。

右爲末。每服一錢匕。猪肝二兩許。批開摻藥卷了。青竹葉裹。麻縷纏定。水一椀。煮令熟。入收口膏餅內熏眼。候温取食。日作。不過十日退。

類證活人書卷第二十二

無閑居士李子建撰　新安師古吳勉學校

傷寒十勸

(一)傷寒頭疼又身熱。便是陽證。不可服熱藥。

傷寒傳三陰三陽。共六經。內太陰病頭不疼身不熱。少陰病有反發熱無頭疼。厥陰病有頭疼而無發熱。故知頭疼又身熱。卽是陽證。若投熱藥必不救。

(二)傷寒當直攻毒氣。不可補益。

邪氣在經絡中。若隨證早攻之。只三四日痊安。醫者乃妄謂先須正氣。卻行補益。使毒氣流熾。致殺人。

(三)傷寒不思飲食。不可服溫脾藥。

傷寒不思飲食。自是常事。終無饑死之理。如理中圓之類。亦不可輕服。若陽病服之。致熱氣增重。或致不救。

(四)傷寒腹痛亦有熱證。不可服溫暖藥。

難經云。痛爲實。故仲景論腹滿時痛之證。有曰痛甚者加大黃。夫痛甚而反加大黃。意可見也。惟身冷厥逆而腹痛者。方是陰證。須消息之。每見醫者。多緣腹痛便投熱藥而致殺人也。

(五)傷寒自利。當看陰陽證。不可例服補暖及止瀉。

自利惟身不熱。手足溫者。屬太陰。身冷四逆者。屬少陰厥陰外。其餘身熱下利。皆是陽證。當隨證依仲景法治之。每見醫者。多緣下利便投暖藥及止瀉藥而殺人。

(六)傷寒胸脇痛及腹脹滿。不可妄用艾灸。

常見村落間有此證。無藥便用艾灸。多致毒氣隨火而熾。膨脹發喘而死。不知胸脇痛。自屬少陽。腹膨脹自屬太陰也。此外惟陰證乃可灸耳。

(七)傷寒手足厥冷。當看陰陽。不可一例作陰證治。有陰厥。有陽厥。醫者少能分辯。陽厥而投熱藥。殺人速於用刃。蓋陽病不至於極熱。不能發厥。仲景所謂熱深者厥深也。熱深而更與熱藥。寧復有活之理。但看初得病而身熱。至三日以後熱氣已深。大便祕。小便赤。或譫語昏憒。及別有熱證而反發厥者。必是陽證也。宜急用承氣湯下之。若初得病身不熱。大便不祕。自引衣蓋身。或下利。或小便數。不見熱證而厥逆者。卽是陰厥也。方可用四逆湯之類。二厥所以使人疑者。緣脈皆沉。然陽厥脈沉而滑。陰厥脈沉而弱。又陽厥時復指爪却溫。陰厥常冷。此爲可別也。

(八)傷寒已在裏。卽不可輕用藥發汗。

傷寒證須看表裏。如發熱惡寒則是在表。正宜發汗。如不惡寒反惡熱。則是裏證。若醫者一例發汗。則所出之汗。不是邪氣。皆是眞氣。邪氣未除。而正氣先涸。死者多矣。又半在表半在裏之證。及有表裏之

證。不惟皆不可下。仍亦皆不可汗。但當隨證而治之可也。

(九)傷寒飲水爲欲愈。不可令病人恣飲過度。

病人大渴。當與之水以消熱氣。故仲景□□□欲愈。人見此說。遂令病人縱飲。□□□□□欬逆爲下利。爲腫。爲悖。爲水結。爲□□□□矣。且如病人欲飲一椀。只可半椀之□□□□爲善也。

(十)傷寒初差。不可過飽及勞動、或食羊肉、及行房事與食諸骨汁、幷飲酒。

病方愈。脾胃尚弱。食而過飽。不能消化。病卽再發。謂之食復。病方愈氣血尚虛。勞動太早。病亦再發。謂之勞復。又傷寒食羊肉。行房事。立死。食諸骨汁酒者。再病之也。

予每念父祖俱死於傷寒。乃取仲景所著。深繹熟硏。八年之後。始大通悟。陰陽經絡。病證藥性。俱了然於胸中。緣比年江淮之民。冒寒避寇。得此疾者頗衆。爰依仲景法隨證而施之藥。所活不啻數百人。仍知傷寒本無惡證。皆是妄投藥劑所致。因追悼父祖之命。皆爲庸醫所殺。而又歎人無間於貧富貴賤。於此不能自曉。則輕付一命於庸工之手也。今輙摭其流傳多誤有害於命者。略開其說。目曰傷寒十勸。其言不欲成文。冀人易曉而以爲深戒云。

王雲五主編
叢書集成初編
類證活人書
附釋音辨誤藥性
二冊

中華民國二十八年十二月初版

撰者　朱肱
發行人　王雲五　長沙南正路
印刷所　商務印書館
發行所　商務印書館　各埠

（本書校對者鮑嘉祥）

G一六〇七上